

Kendo® Spray

Insetticida



Prodotto non più offerto

Insetticida in particolare contro gli insetti nocivi di bacche, verdura, patate, colture da fiore e piante verdi.

- › Anche contro il piralide del bosso
- › Azione rapida e incisiva
- › Impiego versatile
- › Ampia efficacia



 **Acquista online**

 **Disponibile qui**

Coltura

Aglio, Aglio orsino, Alchechengio (*Physalis edulis*), Aneto, Angurie/cocomero, Artemisia comune, Asparagi, Asparago bianco,

Asparago verde, Baby-Leaf (*Asteraceae*), Baby-Leaf (*Barbabetola*), Baby-Leaf (*Brassicaceae*), Baby-Leaf (*Chenopodiaceae*), Barbabetole, Basilico, Batavia, Begonia, Bietola, Bietola da taglio, Borragine, Bossi, Brassica da foglie, Broccoli, Carciofi, Cardo, Cardo azzurro, Carote, Carvi, Catalogna, Cavoletti di Bruxelles, Cavolfiore, Cavoli, Cavoli / rape da taglio, Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa (cavolo rosso/bianco/di Milano), Cavoli cinesi, Cavolo bianco, Cavolo cinese, Cavolo navone, Cavolo nero, Cavolo piuma, Cavolo rapa, Cavolo rosso, Cerfoglio, Cetrioli, Cetrioli per conserva, Cetriolo nostrano, Cetriolo olandese, *Chenopodiaceae*, Ciclamino, Cicoria belga, Cicoria pan di zucchero, Cima di rapa, Cipolla d'inverno, Cipolle, Cipolle da tavola, Cipolle dolci, Cipollotti a mazzi, Colture da fiore e piante verdi, Crescione, Crisantemo, *Cucurbitaceae* (cetriolo, zucca, melone ...), Dragoncello, Erba cipollina, Erbe da cucina, Fagioli, Fagioli con baccello, Fagioli senza baccelli, Fagiolo nano, Fagiolo rampicante, Fave, Finocchio, Fragole, Fragole, Garofani, Geranio, Gerbera, Gladiolo, *Hyacinthus*, Indivia, Indivia e cicoria da foglia, Insalate (*Asteraceae*), Insalate asiatiche (*Brassicaceae*), Insalate del genere *Lactuca*, Iris, Kopfsalate, Lamponi, Lattuga cappuccio, Lattuga crespata, Lattuga da taglio, Lattuga foglia di quercia, Lattuga iceberg, Lattuga romana, Lattughe Iceberg, Levistico, *Liliaceae* (pianti ornamentali), Lollo rossa / bionda, Maggiorana, Mais dolce, May turnips, Melanzane, Melissa, Meloni, *Ombrellifere* (*Apiaceae*), Origano, Pastinaca, Patate, Patate da tavola e da foraggio, Patisson, Peperoncino, Peperone, Peperone dolce, Pepino, Piselli, Piselli con baccello, Piselli senza baccello, Pomodori, Pomodori a grappolo, Pomodori tondi sciolti, Pomodoro ciliegino, Porri, Prezzemolo, Prezzemolo tuberoso, Primule, Rabarbaro, Rafano rustica / Ramolaccio, Ramolaccio, Rapa di Brassica rapa, Rapa di Brassica rapa e *B. napus*, Rape autunnali, Ravanella, Romanesco, Rondini, Rosmarino, Rucola, Salvia, Santoreggia, Scalongo, Scorzonera, Sedano, Sedano da coste, Sedano rapa, Specialità di *Lactuca*, Specialità di pomodori, Spinaci, Tappeto erboso, Timo, Tipi di radicchio e cicorino, Topinambur, Tuberina, Tulipano, Valerianella, Verza, Zucca da olio, Zucca ornamentale, Zucche (buccia non commestibile), Zucche con buccia commestibile, Zucchine

Kendo® Spray

Insetticida



Impiego

Prodotto simile: Insetticida universale spray

In generale: Prodotto in formato pronto all'uso per la spruzzatura. Bagnare bene le piante.

Fragola contro antonomo delle fragole e tripidi.

Lampone (pieno campo) contro antonomo dei lamponi e verme del lampone. Trattare poco prima delle fioritura.

Alchechengio, carciofi, cardo, cicoria belga, cucurbitacee, fagioli, fave, insalate (Asteraceae), mais dolce, melanzana, peperone, pepino, piselli, pomodori, scorzonera, topinambur e tuberina contro afidi, aleurodi, minatrici, notture terricole o vermi grigi e tripidi.

Cavoli/rape da taglio, cima di rapa, insalate asiatiche (Brassicaceae), rabarbaro (trattamenti a intervalli di 7–14 giorni), rafano rusticano/ramolaccio, ramolaccio, rapa di brassica rapa e B. napus, ravanella, rucola e specie di cavoli contro afidi, aleurodi, altiche, cavoliaie, cecidomia del cavolo, minatrici, nottue (defogliatrici), nottue terricole o vermi grigi, tignola delle crocifere e tripidi. Rabarbaro senza cavolaie e cecidomia del cavolo e tignola delle crocifere.

Carote, finocchio, pastinaca, prezzemolo tuberoso e sedano contro mosca della carota. Trattamenti solo durante il volo (secondo numero critico delle catture). Osservare il bollettino fitopatologico. Trattare a intervalli di almeno 7 giorni. Ripetere le trattamenti a seconda delle necessità.

Aglione, cipolle, porro e scalogni contro afidi, aleurodi, minatrici, notture terricole o vermi grigi, tignola del porro e tripidi.

Valerianella contro afidi e nottue terricole o ermi grigi.

Asparagi contro afidi, aleurodi, criocera a dodici punti, criocera dell'asparago, minatrici, notture terricole o vermi grigi e tripidi.

Patate contro dorifera della patata.

Colture da fiore e piante contro afidi, aleurodi, cecidomie, crisomelidi, miridi, notture terricole o vermi grigi, sciaridi e tripidi.

Bosso (Buxus) contro piramide del bosso.

Tappeti erbosi e terreni sportivi contro tipulidi (larve) in caso delle superficie limitata. Per i maggiore superficie utilizzare il Kendo Gold contro le larve di tipula.

Periodo di attesa: fragole, lamponi e patate 3 settimane, altre verdure 2 settimane.

Periodo di applicazione

gennaio – dicembre

Azione

Kendo Spray agisce per contatto e ingestione, indipendentemente dalla temperatura. La nuova formulazione vanta una migliore efficacia (maggiore durata e migliore bagnatura), perché le singole microcapsule sono notevolmente più piccole rispetto a quelle degli insetticidi convenzionali. A contatto con la pianta, le capsule scoppiano e liberano il principio. La nuova formulazione mostra una migliore efficacia grazie alla sua migliore adesione, una migliore resistenza alla lisciviazione e una maggiore durata d'azione.

Commenti

Soltanto in orti familiari. Autorizzato per l'uso non professionale. Indossare guanti protettivi quando si utilizza il prodotto. Trattare l'asparago e rabarbaro dopo il periodo del raccolto. Al massimo 2 trattamenti (fagioli, insalate (Asteraceae), cavoli, pomodori) e 3 trattamenti (porro, cipolle) per coltura oppure 2 trattamenti (rabarbaro e asparago) per anno e particella con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Inoltre in tutte le colture con al massimo 2 trattamenti applicarli a intervalli di 7–14 giorni. Unicamente per le patate: Per evitare l'insorgere di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti un piretroide per più di 1 volta per coltura. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Per proteggere gli organismi acquatici occorre garantire che durante l'applicazione la sostanza nebulizzata non sia immessa in acque di superficie. Bosso: Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Il riutilizzo di questo imballaggio è proibito.



Attenzione

Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H). Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Non disperdere nell'ambiente.

Raccogliere il materiale fuoriuscito. Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale, un servizio di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto. Pericoloso per le api. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

Contenuto

0,0015 % (0,015 g/l) lambda-cialotrina

Numero di approvazione

W-6741-3

Kendo[®] Spray

Insetticida



Confezioni



Quantità:
500 ml

Numero di articolo:
56525

EAN:
7610176069867

 [Acquista online](#)