

TFL - Furkationsbensförlust**Testbeskrivning:**

Bedömning av radiolucens vid tandens furkation (där tanden delas upp i två/tre rötter)

Onormal beskrivning

En radiolucens har upptäckts vid tandens furkation, vilket tyder på förlust av alveolärt ben i detta område.

Furkationsbensförlust är en indikator på närvaron av betydande parodontal sjukdom. Suboptimal röntgenteknik och/eller positionering kan påverka utseendet på alveolärt ben. Röntgensignaler bör tolkas i samband med den orala undersökningen.

TPL - Periapikal lysens**Testbeskrivning:**

Bedömning av radiolucens vid en tandrots spets vilket representerar en patologisk process

Onormal beskrivning

Ett radiolucensområde har upptäckts vid tandens rotspets, vilket troligen representerar en patologisk process. En patologisk periapikal lysens kan visas som en vidgning av parodontal ligamentspalt i apikala regionen, förlust av lamina dura vid spetsen, eller diffus/oregelbunden radiolucens vid spetsen och bör särskiljas från en godartad lysens som en "chevron lysens". Differentialdiagnoser för periapikal lysens inkluderar abscess, cysta, inflammatorisk sjukdom eller andra orsaker. Röntgensignaler bör tolkas i samband med den orala undersökningen. Ytterligare bilder kan vara nödvändiga för att bekräfta närvaron av patologi. Jämförelse med samma tand på motsatt sida kan vara användbar för att avgöra om röntgenförändringar representerar patologi eller artefakt, såsom "chevron lysens".

TRL - Resorptiv lesion**Testbeskrivning:**

Bedömning av områden med förfall eller nedbrytning inuti en tand

Onormal beskrivning

Närvaron av ett område eller flera områden med förfall/nedbrytning har identifierats inuti en tand/tänder, troligtvis som en följd av en resorptiv process. Resorption ser ofta ut som oregelbundna radiolucenser genom hela tanden. Radiolucenta lesioner i tänderna tillskrivs ofta primära resorptiva lesioner, men kan representera andra sjukdomsprocesser som trauma, neoplasia inflammation/infektion, karies, emaljhypoplasia, etc. Röntgenteknik och vinkel kan bidra till ett onormalt utseende på tanden. Röntgensignaler bör tolkas i samband med den orala undersökningen och kliniska tecken.

TAL - Allvarlig fästförlust (alveolärt ben)**Testbeskrivning:**

Bedömning av förlust av alveolärt ben i horisontella och/eller vertikala plan

Onormal beskrivning

Allvarlig förlust av alveolärt ben har identifierats i området runt en rot eller rötter. Förlust av fäste används som en indikator vid gradering av parodontal sjukdom. Fyra röda linjer indikerar över 50% förlust eller grad 4 parodontal sjukdom. Två röda linjer indikerar förlust mellan 25% och 50% eller grad 3 parodontal sjukdom. Röntgenteknik och vinkel kan överdriva eller dölja förlusten av alveolärt ben. Röntgensignaler bör tolkas i samband med den orala undersökningen.

TEC - Signifikant tand med patologi**Onormal beskrivning:**

En patologisk process har identifierats i en hörntand eller käkbenstand. På grund av tandens betydelse för djuret bör alla försök göras för att rädda tanden från utdragning. Allvarlig patologi eller flera patologier inom dessa tänder kan motivera utdragning..

TFX - Tandbrott**Testbeskrivning:**

Bedömning av fraktur inom kronan eller roten på en tand

Onormal beskrivning

En radiolucen linje som representerar en fraktur har identifierats i kronan eller roten på en tand eller tänder. Frakturer kan vara sekundära till trauma eller underliggande patologi, eller kan representera en kvarvarande tandrot. Röntgensignaler bör tolkas i samband med klinisk historia och oral undersökning.

TRR - Kvarvarande rot(rotar)**Testbeskrivning:**

Bedömning av närvaron av en tandrotsrester eller fragment under tandköttet med lite eller ingen krona kvarvarande.

Onormal beskrivning

Kvarvarande rotrester/fragment kan förekomma som en följd av trauma, ofullständig utdragning eller tandresorption. Med få undantag bör kvarvarande rotrester utdras vid tidpunkten för radiografisk diagnos. Fortsatt retention och regelbunden radiografisk övervakning kan övervägas i utvalda fall, men endast om resten är radiografiskt och kliniskt stabil (ingen inflammation, infektion eller annan patologi), liten och känd som kronisk. Denna test kan också identifiera en icke utbruten tand som en kvarvarande tandrot. Icke utbrutna tänder bör utdras för att förhindra utvecklingen av en dentigerös cysta. Dock kan regelbunden radiografisk övervakning utföras istället för utdragning hos äldre patienter.