

APRESENTAÇÕES

Pó para solução oral.

Embalagens com 2, 7 ou 14 envelopes com 17,5 g cada.

Sabor limão.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada envelope contém:

macrogol 3350.....17,0 g

Excipientes q.s.p.*1 env.

* maltodextrina, sucralose, dióxido de silício e aroma de limão.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

PEG-Lax é indicado para desimpactação e manutenção no quadro de constipação persistente e ocasional. Preparação de pacientes para realização do exame de colonoscopia.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

PEG-Lax é um laxativo do tipo osmótico não irritante.

Promove o amolecimento das fezes e o aumento da frequência da evacuação, pela sua capacidade de reter água no interior do intestino.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Esse medicamento é contraindicado para paciente com quadro conhecido ou suspeito de obstrução (náusea, vômito e dor abdominal), perfuração intestinal, apendicite e sangramento retal.

Você não deve utilizar **PEG-Lax** se tiver hipersensibilidade (alergia) ao macrogol ou a qualquer componente da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

No caso de dúvidas, consultar um profissional de saúde.

Não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

O medicamento deve ser administrado conforme orientação presente na rotulagem e bula ou conforme orientação médica. A solução não deve ser armazenada para uso posterior.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C). Proteger da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original.

Características organolépticas: pó fino branco.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A quantidade de envelopes a ser utilizada pelo paciente deve ser consultada nas tabelas abaixo, considerando o peso do paciente, ou conforme orientação médica.

USO ADULTO:

Desimpactação/Desobstrução Intestinal: iniciar a administração com 1 g/kg/dia e, caso necessário, corrigir a dose até 1,5 g/kg/dia pelo período de 6 dias. Não exceder a dose de 100 g por dia.

Manutenção: Iniciar a administração com 0,4 g/kg/dia e, caso necessário, corrigir a dose até 1,5 g/kg/dia pelo período de até 6 meses. Não exceder a dose de 100 g por dia.

Modo de preparo: Recomenda-se dissolver 17 gramas em 250 mL de líquido. Após o preparo, ingerir imediatamente.

Preparação Para Colonoscopia: Administrar 4,5 g/kg/dia um dia antes do exame. Recomenda-se dissolver 17 gramas em 250 mL de líquido e ingerir a solução a cada 30 minutos até o limite de 255 gramas por dia. A administração do medicamento deve ser finalizada até 8 horas antes do procedimento.

USO PEDIÁTRICO:

Desimpactação/Desobstrução Intestinal: Iniciar a administração com 1 g/kg/dia e, caso necessário, corrigir a dose até 1,5 g/kg/dia pelo período de 6 dias. Não exceder a dose de 100 g por dia.

Manutenção: Iniciar a administração com 0,4 g/kg/dia e, caso necessário, corrigir a dose até 1,5 g/kg/dia pelo período de até 6 meses. Não exceder a dose de 100 g por dia.

Modo de preparo: Recomenda-se dissolver 17 gramas em 250 mL de líquido. Após o preparo, ingerir imediatamente.

Preparação para colonoscopia:

Entre 2 e 6 anos: Administrar 4,5 g/kg/dia um dia antes do exame. Recomenda-se dissolver 8,5 gramas em 150 mL de líquido e ingerir a solução a cada 30 minutos até o limite de 255 gramas por dia. A administração do medicamento deve ser finalizada até 8 horas antes do procedimento.

Acima de 7 anos: Administrar 4,5 g/kg/dia um dia antes do exame. Recomenda-se dissolver 17 gramas em 250 mL de líquido e ingerir a solução a cada 30 minutos até o limite de 255 gramas por dia. A administração do medicamento deve ser finalizada até 8 horas antes do procedimento.

Sugestão de uso, considerando o peso do paciente para o tratamento da Desimpactação:

Peso corporal	40-51 kg	52-68 kg	69 kg ou mais
Quantidade de envelopes (17g)	3	4	5

Sugestão de uso, considerando o peso do paciente para a Manutenção:

Peso corporal	40-85 kg	86-120 kg	121-170 kg	170 kg ou mais
Quantidade de envelopes (17g)	2	3	4	5

Sugestão de uso, considerando o peso do paciente para a preparação para Colonoscopia:

2 a 6 anos Recomenda-se o uso da apresentação de PEG-Lax 8,5g.							
Peso corporal	8-11 kg	12-14 kg	15-18 kg	19-21 kg	22-25 kg	26-29 kg	
Quantidade de envelopes (8,5g)	4	6	8	10	12	14	
Acima de 7 anos e Adultos Recomenda-se o uso da apresentação de PEG-Lax 17g.							
Peso corporal	30-33 kg	34-37 kg	38-41 kg	42-45 kg	46-49 kg	50-53 kg	54 kg ou mais
Quantidade de envelopes (17g)	8	9	10	11	12	13	14

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você se esquecer de tomar uma dose, procure tomá-la assim que possível. Se estiver próximo ao horário da dose seguinte, despreze a dose esquecida e volte ao seu esquema normal.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Esse medicamento pode causar diarreias, flatulências, náuseas, cólicas abdominais ou inchaços.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

O efeito do macrogol depende da dose administrada, esperando-se apenas diarreia abundante em caso de superdose (quantidade maior que a indicada). A suspensão do medicamento reverte os sintomas.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC nº 576/2021

Notificado e Produzido por:

Myralis Indústria Farmacêutica Ltda.
Rua Rogélia Gallardo Alonso, 650 • Caixa Postal 011
CEP 13864-304 • Aguaí/SP
CNPJ 17.440.261/0001-25
Indústria Brasileira

ou

Produzido por:

Myralis Indústria Farmacêutica Ltda.
Valinhos/SP
Indústria Brasileira



0800 771 2010
sac@myralis.com.br
www.myralis.com.br

204892 - 01 • 180x310
C/ DOBRA
PH 312

