

APRESENTAÇÕES

Pó para solução oral.

Embalagens com 2, 7 ou 14 envelopes com 17,5 g cada.

Sabor limão.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada envelope contém:

macrogol 3350.....17,0 g

Excipientes q.s.p.*1 env.

* maltodextrina, sucralose, dióxido de silício e aroma de limão.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

PEG-Lax é indicado para desimpactação e manutenção no quadro de constipação persistente e ocasional. Preparação de pacientes para realização do exame de colonoscopia.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

PEG-Lax é um laxativo do tipo osmótico não irritante.

Promove o amolecimento das fezes e o aumento da frequência da evacuação, pela sua capacidade de reter água no interior do intestino.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Esse medicamento é contraindicado para paciente com quadro conhecido ou suspeito de obstrução (náusea, vômito e dor abdominal), perfuração intestinal, apendicite e sangramento retal.

Você não deve utilizar PEG-Lax se tiver hipersensibilidade (alergia) ao macrogol ou a qualquer componente da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

No caso de dúvidas, consultar um profissional de saúde.

Não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

O medicamento deve ser administrado conforme orientação presente na rotulagem e bula ou conforme orientação médica. A solução não deve ser armazenada para uso posterior.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C). Proteger da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original.

Características organolépticas: pó fino branco.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

USO ADULTO:

Desimpactação/Desobstrução Intestinal: iniciar a administração com 1 g/kg/dia e, caso necessário, corrigir a dose até 1,5 g/kg/dia pelo período de 6 dias. Não exceder a dose de 100 g por dia.

Manutenção: Iniciar a administração com 0,4 g/kg/dia e, caso necessário, corrigir a dose até 1,5 g/kg/dia pelo período de até 6 meses. Não exceder a dose de 100 g por dia.

Preparação Para Colonoscopia: Administrar 4,5 g/kg/dia um dia antes do exame. Recomenda-se dissolver 17 gramas em 250 mL de líquido e ingerir a solução a cada 30 minutos até o limite de 255 gramas por dia. A administração do medicamento deve ser finalizada até 8 horas antes do procedimento.

USO PEDIÁTRICO:

Desimpactação/Desobstrução Intestinal: Iniciar a administração com 1 g/kg/dia e, caso necessário, corrigir a dose até 1,5 g/kg/dia pelo período de 6 dias. Não exceder a dose de 100 g por dia.

Manutenção: Iniciar a administração com 0,4 g/kg/dia e, caso necessário, corrigir a dose até 1,5 g/kg/dia pelo

período de até 6 meses. Não exceder a dose de 100 g por dia.

Preparação para colonoscopia:

Entre 2 e 6 anos: Administrar 4,5 g/kg/dia um dia antes do exame. Recomenda-se dissolver 8,5 gramas em 150 mL de líquido e ingerir a solução a cada 30 minutos até o limite de 255 gramas por dia. A administração do medicamento deve ser finalizada até 8 horas antes do procedimento.

Acima de 7 anos: Administrar 4,5 g/kg/dia um dia antes do exame. Recomenda-se dissolver 17 gramas em 250 mL de líquido e ingerir a solução a cada 30 minutos até o limite de 255 gramas por dia. A administração do medicamento deve ser finalizada até 8 horas antes do procedimento.

		40-51kg	52-68kg	69kg ou mais
Sugestão de uso (1-1,5g/kg/dia)	Desimpactação (Máx. 100g/dia Máx. 6 dias)	3x17g	4x17g	5x17g

		40-85kg	86-120kg	121-170kg	170kg ou mais
Sugestão de uso (0,4 - 1,5g/kg/dia)	Manutenção (Máx. 100g/dia Máx. 6 meses)	2x17g	3x17g	4x17g	5x17g

		2 A 6 ANOS						ACIMA DE 7 ANOS E ADULTOS						
USO ADULTO/ PEDIÁTRICO		8-11kg	12-14kg	15-18kg	19-21kg	22-25kg	26-29kg	30-33kg	34-37kg	38-41kg	42-45kg	46-49kg	50-53kg	54kg ou mais
Sugestão de uso (4,5g/kg/dia)	Colonoscopia (Máx. 255g)	4x8,5g	6x8,5g	8x8,5g	10x8,5g	12x8,5g	14x8,5g	8x17g	9x17g	10x17g	11x17g	12x17g	13x17g	14x17g ou conforme recomendação médica

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você se esquecer de tomar uma dose, procure tomá-la assim que possível. Se estiver próximo ao horário da dose seguinte, despreze a dose esquecida e volte ao seu esquema normal.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Esse medicamento pode causar diarreias, flatulências, náuseas, cólicas abdominais ou inchaços.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

O efeito do macrogol depende da dose administrada, esperando-se apenas diarreia abundante em caso de superdose (quantidade maior que a indicada). A suspensão do medicamento reverte os sintomas.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

TODOS OS MEDICAMENTOS DEVEM SER MANTIDOS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC nº 576/2021

Farmacêutica Responsável:

Rita de Cássia Oliveira Mate
CRF - SP nº 19.594

Notificado e Fabricado por:

Myralis Indústria Farmacêutica Ltda.
Rua Rogélia Gallardo Alonso, 650 • Caixa Postal 011
CEP 13864-304 • Aguai/SP
CNPJ 17.440.261/0001-25
Indústria Brasileira

ou

Fabricado por:

Myralis Indústria Farmacêutica Ltda.
Valinhos/SP
Indústria Brasileira



0800 771 2010
sac@myralis.com.br
www.myralis.com.br

204316 - 00 • 180x310
PH 114

