

# nasoar<sup>®</sup>

infantil

## cloreto de sódio

0,9% **ALTO VOLUME**

Myralis

### APRESENTAÇÕES

#### Granulado para solução nasal

Embalagens contendo 15 envelopes com 1,080 g cada.

Embalagens contendo 15 envelopes com 1,080 g cada, com frasco aplicador.

### USO NASAL

#### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada envelope contém:

cloreto de sódio.....1,080 g

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Lavagem nasal.

#### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

NASOAR INFANTIL age mecanicamente sobre a mucosa nasal, fluidificando e removendo o muco ali presente, resultando na descongestão local.

#### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado em casos de hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes da fórmula.

#### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Recomenda-se o uso de NASOAR INFANTIL para crianças a partir de 2 anos de idade, que conseguem permanecer na posição sentada, para aplicação adequada do produto.

É importante a presença de um adulto para auxiliar a criança nas lavagens nasais.

O frasco deve ser usado apenas por um paciente, evitando a transmissão de doenças. No caso de dúvidas sobre o procedimento de uso, procure um profissional da saúde.

Apesar de não existirem estudos específicos realizados em mulheres grávidas, NASOAR INFANTIL pode ser utilizado pelas mulheres durante a gravidez e a amamentação.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento deve ser armazenado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

NASOAR INFANTIL é um pó branco, inodoro, levemente cristalino. **Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Após preparo, usar imediatamente.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Após preparo, a solução deve ser utilizada por completo e não deve ser armazenada. Fazer a irrigação nasal de

3 a 4 vezes ao dia ou a critério médico utilizando o frasco aplicador.

**Modo de lavagem do frasco:** Logo após o uso, lave o frasco com água e pouco sabão; Enxague bem e garanta que não restou nenhum resíduo; Deixe secar naturalmente em um local arejado; Garanta que antes de guardar não tenha restado partículas de água dentro do frasco. É recomendado a troca do frasco a cada 3 meses.

#### Modo de uso:

Para uma lavagem nasal adequada é necessário um volume adequado de soro fisiológico. A lavagem deve ser realizada com baixa pressão, apertando o frasco levemente e, ao iniciar a pressão no frasco, o fluxo deverá continuar para cima, passando por cima do septo e fluindo através da outra passagem nasal. Isso promoverá a remoção de alérgenos, irritantes, excesso de muco e outros compostos presentes no fluxo nasal. Até que esse ciclo aconteça, você não obterá uma limpeza completa.



#### 1. Preparação da solução nasal:

Dilua dentro do frasco o conteúdo do envelope em 120 ml de água filtrada ou fervida por 5 minutos e resfriada. Use a água em temperatura ambiente ou morna para um maior conforto. Feche o frasco firmemente para garantir que o produto não vaze e agite a solução. No caso da água fervida e resfriada é aconselhável testar a temperatura da água aplicando uma pequena quantidade no dorso da mão, antes de usar na criança.



#### 2. Posição para lavagem nasal:

Coloque a criança em pé ou na posição sentada, mantendo a boca aberta. Incline levemente o tronco dela sobre uma pia ou bacia e vire gentilmente a cabeça para o lado. Ajude a criança a posicionar o bico do frasco na narina

inclinada para cima sem pressioná-lo contra o septo nasal, evitando ferimentos.



#### 3. Aplicação da solução nasal:

Aperte o frasco gentilmente para que a solução faça o fluxo da narina superior até a inferior. Caso a criança sinta-se confortável, ela mesma poderá segurar e apertar o frasco gentilmente, sob supervisão de um adulto. Incentive a criança a respirar pela boca durante toda a lavagem nasal. Ao final, evite assoar o nariz com força, secando suavemente as narinas para limpeza do excesso de soro e muco. Repita o procedimento na outra narina, caso necessário.

### Recomendações:

- O frasco é livre de BPA, no entanto recomenda-se não ferver ou esquentá-lo no microondas para não alterar suas propriedades;
- Caso você tenha realizado alguma intervenção cirúrgica na região nasal / auricular, utilize este produto sob orientação médica;
- Recomendamos não realizar a lavagem nasal imediatamente antes de se deitar, pois este procedimento pode ocasionar desconforto durante o sono;
- Evite realizar o procedimento de limpeza nasal em pacientes acamados ou que estejam deitados durante a lavagem;
- A quantidade de solução a ser aplicada para a realização da lavagem nasal é de cerca de 5 ml a 30 ml em cada passagem nasal, dependendo da pressão exercida pelo paciente;
- Caso haja perdas consideráveis do produto durante a lavagem, recomenda-se repetir o procedimento para obtenção do efeito desejado;
- Não respire pelas narinas durante o procedimento, pois pode haver o risco de deglutição do conteúdo administrado;
- Utilize somente água tratada e filtrada ou preferencialmente fervida por 5 minutos e resfriada.
- A água poderá ser utilizada em temperatura ambiente ou morna. No caso da água fervida e resfriada é aconselhável testar a temperatura da água aplicando uma pequena quantidade no dorso da mão, antes de usar na criança;
- Siga estritamente os passos indicados no modo de uso do produto para que ocorra os efeitos desejados sem a ocorrência de efeitos adversos indesejados;
- O frasco aplicador é específico e testado exclusivamente para uso com o conteúdo do envelope, não sendo recomendado seu uso para outros fins;
- Quando necessário, realizar a limpeza do frasco com água corrente. Caso a limpeza não seja possível, recomenda-se o descarte deste;
- Não dosar e/ou reaproveitar conteúdos sobressalentes do envelope, o mesmo deverá ser utilizado como dose única e, caso haja algum conteúdo residual, este deverá ser descartado.

### ATENÇÃO: NÃO É RECOMENDADO O USO DE SOLUÇÕES CASEIRAS PARA A LAVAGEM NASAL.

O uso de soluções caseiras apresenta divergências em relação às concentrações de sais e pode ocasionar irritação e outros desconfortos nasais. Por este motivo, não é

### DIZERES LEGAIS:

#### Farmacêutica Responsável:

Rita de Cássia Oliveira Mate  
CRF-SP nº 19.594

#### Notificado e fabricado por:

Myralis Indústria Farmacêutica Ltda.  
Rua Rogélia Gallardo Alonso, 650  
Caixa Postal 011  
CEP: 13.864-304 - Aguai/SP  
CNPJ: 17.440.261/0001-25

#### Indústria Brasileira

ou

#### Fabricado por:

Myralis Indústria Farmacêutica Ltda.  
Valinhos/SP  
Indústria Brasileira

recomendado o uso de soluções caseiras ou que não sejam autorizadas para a realização da lavagem nasal.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

### 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você se esquecer de administrar uma dose, poderá utilizar o medicamento a qualquer momento e retomar o tratamento até o alívio dos sintomas.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Nenhum evento adverso com cloreto de sódio 0,9% foi relatado em qualquer estudo que avaliou a lavagem nasal.

Os efeitos secundários menores foram mais comuns, incluindo uma sensação de desconforto com a primeira administração. Os efeitos colaterais observados por menos de 10% dos usuários de lavagem nasal incluíram plenitude auditiva autolimitada, agulhadas na mucosa nasal, irritação nasal, coceira e raras epistaxes (sangramento nasal).

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

### 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?

Não existem relatos da ocorrência de casos de superdosagem com este medicamento.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.**

**MEDICAMENTO NOTIFICADO  
conforme RDC nº 576/2021.**



**0800 771 2010**  
sac@myralis.com.br  
www.myralis.com.br

204878 - 00 • 180x310  
PH 346

