

Työohje: Muistipoliklinikka: Seurantasoitto 1 kk lääkehoidon aloituksen jälkeen

Vastuualue: Geriatriinen osaamiskeskus
Erikoisala/Palvelualue/Yksikkö: Muistipoliklinikka
Hyväksyjä: Heikki Hyvärinen
Laatija: Siru Siimes
Hyväksytty: 1/24
Voimassa: Toistaiseksi

Seurantasoitto asiakkaalle

Soitto asiakkaalle/omaiselle 3-4 vkoa ja tarvittaessa 3 kk:ta muistisairauden lääkehoidon aloituksesta:

- Onko voinnissa tapahtunut muutoksia?
- Millainen on ruokahalu? Muutokset painossa?
- Nukkuminen, onko yöunet ennallaan?
- Onnistuuko lääkehoito suunnitellusti, tuleeko lääke otettua ajallaan?
- Onko tullut haittoja?
- Omaisen jaksaminen?

Muistisairauden lääkkeiden tavallisimpia haittoja

Memantiini

Huimaus, tasapainohäiriöt, uneliaisuus, päänsärky, kohonnut verenpaine, hengenahdistus, ummetus, hengästyminen

Donepetzil

Pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, ruokahalun heikkeneminen, ahdistus, masennus, delirium, kiihtyneisyys, päänsärky, huimaus, pyörtyminen, ripuli, ruoansulatushäiriöt, vatsakipu, virtsainkontinenssi, uniongelmat

Rivastigmiini (tabletti ja laastari)

Ruokahaluttomuus, huimaus, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, painajaiset, kiihtymystilat, sekavuus, ahdistuneisuus, päänsärky, uneliaisuus, vapina, vatsakipu ja ruoansulatusvaivat, voimakas hikoilu, väsymys,

heikkous, huonovointisuus, virtasanpidätyskyvyn heikentyminen, syljen liikaeritys, ihoreaktiot lääkkeen antokohdassa (laastari)

Galantamiini

Oksentelu, pahoinvointi, ruokahalun heikkeneminen, aistiharhat, masennus, pyörtyminen, heitehuimaus, vapina, päänsärky, uneliaisuus, kohonnut verenpaine, vatsakipu, ripuli, lihaskouristukset, väsymys, voimattomuus, hengitysvaikeudet, kaatuilu, hidas sydämen syke