

## Työohje: Muistipoliklinikka: Seurantasoitto 1 kk lääkehoidon aloituksen jälkeen

Vastuualue: Geriatriinen osaamiskeskus  
Erikoisala/Palvelualue/Yksikkö: Muistipoliklinikka  
Hyväksyjä: Heikki Hyvärinen  
Laatija: Siru Siimes  
Hyväksytty: 1/24  
Voimassa: Toistaiseksi

### Seurantasoitto asiakkaalle

Soitto asiakkaalle/omaiselle 3-4 vkoa ja tarvittaessa 3 kk:ta muistisairauden lääkehoidon aloituksesta:

- Onko voinnissa tapahtunut muutoksia?
- Millainen on ruokahalu? Muutokset painossa?
- Nukkuminen, onko yöunet ennallaan?
- Onnistuuko lääkehoito suunnitellusti, tuleeko lääke otettua ajallaan?
- Onko tullut haittoja?
- Omaisen jaksaminen?

### Muistisairauden lääkkeiden tavallisimpia haittoja

#### Memantiini

Huimaus, tasapainohäiriöt, uneliaisuus, päänsärky, kohonnut verenpaine, hengenahdistus, ummetus, hengästyminen

#### Donepetzil

Pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, ruokahalun heikkeneminen, ahdistus, masennus, delirium, kiihtyneisyys, päänsärky, huimaus, pyörtyminen, ripuli, ruoansulatushäiriöt, vatsakipu, virtsainkontinenssi, uniongelmat

#### Rivastigmiini (tabletti ja laastari)

Ruokahaluttomuus, huimaus, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, painajaiset, kiihtymystilat, sekavuus, ahdistuneisuus, päänsärky, uneliaisuus, vapina, vatsakipu ja ruoansulatusvaivat, voimakas hikoilu, väsymys,

heikkous, huonovointisuus, virtasanpidätyskyvyn heikentyminen, syljen liikaeritys, ihoreaktiot lääkkeen antokohdassa (laastari)

### **Galantamiini**

Oksentelu, pahoinvointi, ruokahalun heikkeneminen, aistiharhat, masennus, pyörtyminen, heitehuimaus, vapina, päänsärky, uneliaisuus, kohonnut verenpaine, vatsakipu, ripuli, lihaskouristukset, väsymys, voimattomuus, hengitysvaikeudet, kaatuilu, hidas sydämen syke