

Prednidelt® 30 mg végbélkúp

Szteroid terápia új fényben – **Prednidelt® 30 mg** – a prednizon tartalmú kúp

az egyetlen forgalomban lévő, kúp formában adható prednizon készítmény

Azonnali segítséget jelent pseudo-krupp-ban és hasonló esetekben: asztmás roham, akut allergiás reakció esetén!



GYERMEKEKNEK

és

FELNŐTTEKNEK

HATÉKONY

REKTÁLIS SZTEROID

terápia



BIOTECH

“Movement is Life”

Prednidelt® 30mg végbélkúp

Miért a **Prednidelt® 30mg** végbélkúp?

A Prednidelt hatóanyaga a *prednison*, glükokortikoid hatású, gyulladáscsökkentő, allergiaellenes tulajdonsággal rendelkezik, melyet már több mint 40 éve eredményesen alkalmaznak a standard orvosi terápiában:

- glükokortikoid hatású,
- antiexsudatív,
- antiproliferatív,
- antiflogisztikus,
- immunszuppresszív,
- antiallergiás tulajdonságokkal rendelkezik és
- befolyásolja az anyagcserét.

A Prednidelt® kúp jelenleg is az egyetlen forgalomban lévő, **kúp formában beadható prednison** készítmény.

Tolerálhatósága és felszívódási viszonyai lényegesen kedvezőbbek az orálisan alkalmazott glükokortikoid készítményeknél.

Ez az alkalmazási mód a legkedveltebb a csecsemők és kisgyermekek kezelésében, mivel

- **jól felszívódik és gyorsan fejti ki hatását,**
- **nem vált ki félelmet a gyermekeknél,**
- **rendkívül hatékony,**
- **a terápia pontosan követhető,**
- **nem okoz helyi gyulladást**

Ideális szteroid terápia felnőttek számára is, mivel

- akkor is alkalmazható, amikor az orális ill. injekciós terápia nem ajánlatos vagy nem eredményes.

Prednidelt® 30mg végbélkúp javallatai:

- Klasszikus indikációi:
 - **asthma bronchiale,**
 - **allergiás reakciók,**
 - **akut és krónikus rheumás megbetegedések,**
 - **colitis ulcerosa,**
 - **súlyos akut dermatosis**
- Gyermeknek:
 - **pseudokrupp (akut laryngotrachealis stenosis),**
 - **krupp,**
 - **spasticus bronchitis eseteiben javallt**

Prednidelt® 30mg alkalmazási módja és időtartama:

Napi maximális dózis gyermekeknél:

- 1 éves kor alatt: 2,5-5 mg/nap testsúly kg-ként
 - 1-10 éves kor alatt: 5-10 mg/nap testsúly kg-ként
 - 10-14 éves kor alatt: 5-15 mg/nap testsúly kg-ként
- jóllehet gyermekeknél igen eltérő reakciók várhatók.

Napi maximális dózis felnőtteknél:

- hiperakut és sürgős esetekben: 100-200mg Prednidelt
- akut és gyulladáshoz vezető esetekben: 50-100mg Prednidelt
- krónikus betegségekben: 30-50mg Prednidelt

Súlyos, akut állapotokban a szokásos **napi** adag 100-200 mg, tartós kezeléskor 30 mg, reggelente alkalmazva.

Az alkalmazás időtartama a betegség lefolyásától függ így az akut megbetegedések általában csak rövid ideig tartó terápiát igényelnek. **Pszedo-krupp esetében** az alkalmazás lehetőség szerint ne haladja meg a 2 napot.

Hosszabb ideig tartó kezelést ajánlott a cirkadián ritmushoz igazítani, azaz a napi gyógyszeradagot korán (reggel 6 és 8 óra között) kell egyszerre beadni.

Az alkalmazás naponta vagy váltakozva történhet (ez utóbbi esetben minden másnap dupla adagot adunk).

Prednidelt® 30mg túladagolása:

Súlyos akut betegségek, életveszélyes állapotok esetében a rövid távú, nagy adag glükokortikoid terápiának ellenjavallata nincs.

Prednizonnal vagy egyéb glükokortikoiddal történt akut mérgezések eddig nem ismeretesek. Felnőttek 2000 mg vagy ennél több prednizont képesek elviselni komplikáció nélkül.

Prednidelt® 30mg ellenjavallatai:

- rövid ideig tartó kezelésnél:

A készítmény hatóanyagával vagy segédanyagával (szilárd zsír) szembeni túlérzékenység. Sürgősségi esetekben (akut terápia) rövid ideig tartó, 1-2 napos alkalmazása esetén abszolút ellenjavallat nem ismert.

- hosszú ideig tartó kezelésnél:

gyomor-és nyombélfekély, amőbás fertőzés

súlyos osteoporosis,

szisztémás gombás megbetegedés,

szélsőséges magasvérnyomás

szűk és nagylátószögű glaukóma,

védőoltást megelőzően és követően, BCG oltás utáni lymphadenitis,

súlyos vírusos fertőzés (Herpes simplex és zoster, Varicella)

poliomyelitis (kivéve a bulbáris agyvelőgyulladást)

Prednidelt® 30mg mellékhatásai:

rövid ideig tartó kezelésnél: 1-2 napos kezelésnél NINCS

hosszú ideig tartó kezelésnél: Cushing-szindróma

elhízás

magasvérnyomás

csonttritkulás

izombántalom

gyomor- és nyombélfekély

pszichés zavar

káliumhiány

Cukorbetegség esetén **diabéteszes anyagcserezavart** indukálhat a hosszú ideig tartó kezelés!

Prednidelt® 30mg kölcsönhatásai:

Szalicilátokkal (Aspirin, Istopirin, Kalmopyrin, Aspo) és **nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel** egyidejűleg adva megnövekszik a gyomor béltraktus vérzési hajlama.

Szívglükózidokkal történő egyidejű adása fokozott glükózid hatást eredményez a szteroid-függő K kiválasztás miatt.

Szaluretikumok egyidejű alkalmazása esetén megnövekedett K-kiválasztással kell számolni.

Antidiabetikumok vagy **kumarin-származékok** hatását egyidejű Prednidelt® 30mg alkalmazása csökkenti.

Rifampycin, fenitoin és barbiturátok csökkentik a **Prednidelt® 30mg** hatását.



Figyelmeztetés!

A kúpot minden esetben mélyen a végbélbe kell elhelyezni!

Terhesség, szoptatás ideje alatt és menopauzában csak az előny/kockázat gondos mérlegelése után szabad alkalmazni.

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Eltarthatóság:

Száraz hűvös helyen (25°C alatti hőmérsékleten) tárolandó.

Felhasználható a dobozon jelzett időpontig.

A Prednidelt® 30mg kúpokat a csomagoláson megadott lejáratí idó után felhasználni TILOS!



Lezárás dátuma: 2021.12.21.



BIOTECH

www.biotech-medical.com

e-mail: ag@biotech-medical.net

Distributor:

