

HumicSoil^{MR}

ÁCIDOS HÚMICOS Y FÚLVICOS. CRISTALES ULTRASOLUBLES.

HumicSoil, son cristales ultrasolubles que contienen la mayor concentración y alta pureza de ácido húmico que existen en el mercado actualmente. Los elementos activos que lo comprenden son ácidos húmicos y fúlvicos 100% asimilables. Su uso induce el desarrollo del sistema radicular, crecimiento de la planta; aumenta el nivel de materia orgánica, la floculación, textura, aumenta el intercambio iónico y por lo tanto la fertilidad de los suelos, además de suministrar potasio de inmediata asimilación y liberar otros nutrientes en el suelo.

COMPOSICIÓN

INGREDIENTES ACTIVOS		% en Peso
ÁCIDOS HÚMICOS	No menos de	47.38
ÁCIDOS FÚLVICOS	No menos de	42.62
POTASIO (K)	No menos De	9.00
INGREDIENTES INERTES		
ELEMENTOS RELACIONADOS Y	No más de	1.00
ACONDICIONADORES		
TOTAL		100.00

RECOMENDACIONES PARA SU USO

HUMICSOIL puede ser aplicado a través de todos los sistemas de riego (goteo, cintilla, aspersión y rodado) o en forma foliar disuelto en agua.

INCOMPATIBILIDAD

HUMICSOIL, es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares, fungicidas, insecticidas y herbicidas utilizados en la agricultura. Sin embargo, es recomendable realizar pruebas previas antes de utilizarlo en la práctica.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO / QUÍMICAS

Rango de pH: 10.0 - 11.0

Rango de densidad: ND

Color: Negro **Apariencia:** Polvo

PRESENTACIONES

100 gr y 1 Kg

VENTAJAS

- 90% de ácidos húmicos y fúlvicos, 100% asimilables.
- Producto orgánico.
- Crea materia orgánica.
- Ultrasoluble.



Circuito Parque Industrial 252,
Morelia, Michoacán, México.



info@cosustenta.com



+52 (443)520-4951



www.biosustenta.com.mx

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO				
	CULTIVO	DOSIS Kg/Ha.		ÉPOCA DE APLICACIÓN
	Algodón	RIEGO	0.6-1.0	1) Primer riego de auxilio. 2) Al iniciar el papaloteo. 3) Al llenar la bellota.
		FOLIAR	0.1-0.2	1) Antes de la floración. 2) En la floración. 3) Amarre de la bellota.
	FRUTALES: Palma Africana, Cacao, Peral, Nogal, Durazno, Almendro, Mango, Manzano y Aguacate	RIEGO	1.0-1.5	1) Floración. 2) Al clareo. 3) Desarrollo o formación del fruto.
		FOLIAR	0.2-0.3	Al follaje todas las veces que se haga una aplicación.
	Papa y otros tubérculos	RIEGO	1.0-1.5	1) 1er. Tratamiento bañando la papa a la hora de la siembra. 2) 2do. Tratamiento antes de la floración y zonas donde no florece cuando comiencen a tuberizar. 3) 3er. Tratamiento después de la floración o 20 días antes de tuberizar.
		FOLIAR	0.1-0.2	Cada vez que aplique el fertilizante foliar antes y después de la
	FLORES Y HORTALIZAS: Tomate, Lechuga, Brócoli, Apio, Espinaca, Calabaza, Berenjena, Ají, Melón, Sandía, Espárragos, Ajo, Fresa y Pepino	RIEGO	1.0-1.5	1) En el riego de asiento. 2) Antes de la floración. 3) Durante la formación de frutos.
		FOLIAR	0.2-0.3	Cada vez que se aplique un fertilizante foliar, mezclando el HUMICSOIL siempre al último.
	CEREALES: Maíz, Sorgo, Cebada, Avena, Trigo y Arroz	RIEGO	0.8-1.0	1) Primer riego de auxilio 2) Dos aplicaciones más con intervalos de 20 días.
		AL SUELO DE TEMPORAL	1.0-1.05	Mezclado con los fertilizantes base o tradicionales.
		FOLIAR	0.1-0.2	Empezando cuando la planta tenga 30 cms. de altura cada vez que se haga una aplicación antes de espigar.
	OLEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS: Arveja, Frejol, Garbanzo, Soya, Ajonjolí, Girasol, etc.	RIEGO	1.0	1) En la siembra. 2) Antes de la floración.
		AL SUELO DE TEMPORAL	1.0	Mezclado con los fertilizantes base o tradicionales.
		FOLIAR	0.1-0.2	1a. Aplicación al mes de haber germinado, repitiendo cada 20 días la aplicación.
	Piña	AL SUELO	1.0 - 1.5	Aplicado a la base del suelo inmediatamente después del trasplante y/o en mezcla con los fertilizantes.
		FOLIAR	0.2 – 0.3	Aplicar en mezcla con los fertilizantes foliares, aplicando al inicio el HUMICSOIL .
	Banano	AL SUELO	1-2	1) En cada aplicación en mezcla con el fertilizante. 2) Inicio de desarrollo del hijuelo. 3) En prefloración. 4) Inicio de crecimiento del fruto.
		FOLIAR	0.2 – 0.3	1) Inicio de desarrollo de hojas. 2) Cada vez que se aplique un fertilizante foliar, mezclando HUMICSOIL , siempre al último.
	Cacao	RIEGO	1.0 – 1.5	1) 10 a 15 días después de la fertilización al suelo y/o en mezcla con el fertilizante.
		FOLIAR	0.1 – 0.2	1) Cada que se aplique el fertilizante foliar. 2) En pleno crecimiento vegetativo.
INVERNADERO		5-15 g/L		Aplicar la dosis baja al 1er. par de hojas, la media al 2do. par de hojas y la alta al aparecer el 3er. par de hojas.
EN MEZCLA CON HERBICIDAS		0.1-0.2		Aplicar la dosis baja en preemergencia y la dosis alta en post-emergencia
EN MEZCLA CON FERTILIZANTES AL SUELO		3-6		Aplicar 3 kilos en suelos arenosos, aplicar 5 kilos en suelos arcillosos v aplicar 6 kilos en suelos sódicos.



Circuito Parque Industrial 252,
Morelia, Michoacán, México.



info@cosustenta.com



+52 (443)520-4951



www.biosustenta.com.mx