

Usted recibió la vacuna de Pfizer

Información importante para aquellos que reciban la vacuna contra COVID-19

Gracias por vacunarse contra COVID-19. Usted es una parte importante de nuestros esfuerzos para detener la propagación y mantener nuestras comunidades seguras.

¡Usted no está completamente vacunado aún!

Necesita recibir su segunda dosis para estar completamente vacunado. Hasta entonces, todavía puede contraer y transmitir COVID-19. Entre las dosis y después de su segunda dosis, siga practicando hábitos para reducir la propagación.



Lávese las manos



Use una mascarilla



Mantenga la distancia



Evite grupos

No todos estarán vacunados cuando usted lo esté. Y si bien sabemos que reduce los síntomas considerablemente, todavía estamos aprendiendo sobre la protección de la vacuna contra COVID-19 en condiciones de la vida real.

Inscríbase para su segunda dosis de PFIZER

Programe o confirme cómo programar su cita para recibir la segunda dosis antes de irse de su primera cita

- Debe administrarse su segunda dosis 21 días después de su primera dosis.
- Vacúnese en el mismo lugar de su primera dosis.
- Debe recibir la misma vacuna para su segunda dosis

Usted puede experimentar efectos secundarios; los efectos secundarios significativos son poco frecuentes.

Los efectos secundarios graves a causa de las vacunas, incluidos los de la vacuna contra COVID-19, son poco frecuentes. Los efectos secundarios más comunes son menores e incluyen:

- Dolor en el lugar de la inyección
- Dolor muscular y/o dolor articular
- Dolor de cabeza
- Cansancio
- Escalofríos
- Fiebre

Estos efectos secundarios pueden durar varios días pero no son razón para alarmarse. Si persiste el dolor en el lugar de la inyección o tiene inquietudes, comuníquese con su médico. Si no tiene un médico de atención primaria o desea notificar algún efecto secundario a los CDC, visite [cdc.gov/vsafe](https://www.cdc.gov/vsafe)

Para ver más información visite [Mass.gov/COVIDvaccine](https://www.mass.gov/COVIDvaccine)

