

Reconocimiento

Premiado el médico Víctor Domínguez por una investigación del cáncer rectal

El estudio ha sido reconocido por la Academia Médico-Quirúrgica Española por revelar la utilidad de un biomarcador para predecir la respuesta al tratamiento

PABLO PARRA
Cáceres

El médico verato Víctor Domínguez Prieto ha sido distinguido con el Premio Anual a Mejor Trabajo de Investigación 2025 otorgado por la Academia Médico-Quirúrgica Española, un reconocimiento que subraya la relevancia científica y clínica de su investigación en el ámbito de la oncología digestiva.

Natural de Villanueva de la Vera, Domínguez ejerce como especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, centro en el que desarrolla su labor asistencial e investigadora. El trabajo premiado, titulado 'La ratio de metilación del gen SEPTINA9 predice la respuesta tumoral a la terapia neoadyuvante total en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado', aporta evidencias sobre la utilidad de este biomarcador molecular para anticipar la respuesta completa a la quimiorradioterapia.



Miguel Domínguez Prieto.

Este hallazgo abre la puerta a estrategias terapéuticas más personalizadas y, en determinados casos, podría permitir evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias, reduciendo así la morbilidad asociada y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Según ha informado la Funda-

ción Jiménez Díaz, el proyecto ha sido desarrollado de forma multidisciplinar por los Servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, integrado por los doctores Víctor Domínguez, Miguel León, Héctor Guadalajara y Damián García Olmos, y de Oncología, con la

participación de las doctoras Cristina Caramés, Eva Ruiz Hispán, Raquel Fuentes y Diana Rosero.

Además, también han colaborado cuatro investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD): Mariano García Arranz, Rocío Olivera, Rocío Barrueco y Luz Vega.

Un tumor de alta incidencia

El cáncer de recto forma parte del grupo de tumores colorrectales y constituye uno de los cánceres más frecuentes en los países occidentales. Su incidencia aumenta con la edad y está asociada a factores de riesgo como la predisposición genética, las enfermedades inflamatorias intestinales, el sedentarismo, la obesidad y determinados hábitos dietéticos.

En los casos localmente avanzados, el tratamiento estándar incluye quimioterapia y radioterapia antes de la cirugía, lo que se conoce como terapia neoadyuvante, con el objetivo de reducir el tamaño del tumor y mejorar el control local de la enfermedad. ■