

## Avance médico

El centro hospitalario coruñés incorpora una técnica mínimamente invasiva, consistente en un pequeño dispositivo, tipo clip, para el tratamiento de la dolencia

# Quirónsalud A Coruña mejora el manejo de la insuficiencia mitral

**REDACCIÓN**  
A Coruña

El Hospital Quirónsalud A Coruña ha realizado con éxito una técnica mínimamente invasiva destinada a la reparación transcatheter de la válvula mitral, mediante un dispositivo, tipo clip, que permite abrir una alternativa quirúrgica a la insuficiencia mitral.

El sistema consiste en un pequeño dispositivo, tipo clip, que se coloca en la válvula mitral mediante un catéter introducido por una punción en la vena periférica de la ingle y, a través de esta, se sube hasta la aurícula para sujetar las dos valvas de la válvula del corazón.

Pacientes con insuficiencia mitral grave que no pueden someterse a cirugía convencional, especialmente personas mayores o con alto riesgo quirúrgico, además de que tengan una anatomía adecuada para el dispositivo, pueden someterse a esta técnica.

Los doctores Pablo Piñón y José Manuel Vázquez, especialistas en cardiología en el Hospital Quirónsalud A Coruña, llevaron a cabo el procedimiento. «La incorporación de esta técnica permite ofrecer a nuestros pacientes una nueva alternativa dentro de las intervenciones cardíacas mediante procedimientos mínimamente invasivos, con una recuperación más rápida y menor riesgo de



**Equipo del Hospital Quirónsalud A Coruña que realizó la técnica.**

complicaciones», destacan los especialistas. El centro hospitalario explica en un comunicado que esta técnica se suma a otras que ya realizaba, como la revascularización coronaria, el implante de válvulas aórticas o el cierre de determinadas alteraciones cardíacas como la orejuela izquierda o el foramen oval.

En Europa, la insuficiencia mitral moderada o grave afecta a alrededor del 0,6-0,7% de las personas mayores de 50 años. En los mayores de 75 años, esta cifra aumenta hasta el 10%.

«La insuficiencia mitral ocurre cuando la válvula mitral del cora-

zón, que está entre la aurícula y el ventrículo izquierdos, no cierra bien. Al no cerrarse por completo, parte de la sangre que debería salir hacia el resto del cuerpo vuelve hacia la aurícula. Esto hace que el corazón tenga que trabajar más de lo normal, porque la sangre entra y sale varias veces del ventrículo izquierdo. Con el tiempo, aumenta la presión en la aurícula izquierda y en las venas de los pulmones, lo que puede provocar arritmias y sensación de falta de aire, incluso, con esfuerzos pequeños», explica el doctor Vázquez. ■

L.O.