

Denuncia

Nuevos fármacos contra el cáncer tardan hasta 3 años en llegar a España

La brecha es «especialmente grave» en tumores digestivos con escasas alternativas terapéuticas y mal pronóstico, aseguran médicos

NIEVES SALINAS

España es el primer país de la Unión Europea en investigación clínica oncológica, pero ocupa uno de los últimos puestos en acceso a los fármacos que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya ha aprobado: tratamientos que países como Alemania o Austria incorporan «de forma casi inmediata» a su sistema sanitario, tardan entre dos y tres años en llegar a los pacientes, «una brecha especialmente grave en tumores digestivos con escasas alternativas terapéuticas y mal pronóstico».

Así se ha denunciado en la segunda edición de «ConVivir: Simposio de Vida y Tumores Digestivos», encuentro celebrado en el Palau Macaya de Barcelona que contó con la asistencia de cerca de 260 pacientes, familiares, cuidadores y especialistas en tumores de vías biliares, páncreas, peritoneo, hígado, colon y recto o estómago.

Tumores digestivos

En la jornada se subrayó que los tumores digestivos son, en conjunto, el grupo de cáncer primario más diagnosticado en España: en 2026 se alcanzará una incidencia total de 301.884 nuevos casos de cáncer, más del 25% de los cuales tiene su origen en el aparato digestivo. A ello se suma una tendencia que preocupa a los especialistas y que se expuso en la jornada: el aumento de los diagnósticos en la población adulta joven.

En su conferencia magistral, la



Numerosas pastillas de medicamentos.

doctora Teresa Macarulla, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona, expuso el largo proceso que debe superar un medicamento hasta llegar a los pacientes –desde los ensayos clínicos hasta la evaluación de la EMA y la negociación de precio con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Macarulla alertó de las demoras que ese itinerario genera en España. «Es un proceso largo, a menudo demasiado largo, algunas veces excesivamente largo», afirmó.

En tumores como el de páncreas o los de vías biliares (con tasas de supervivencia a cinco años inferior-

res al 20%) los plazos de acceso a la innovación en España «resultan clínicamente inaceptables», señalan los organizadores del encuentro: la Asociación Tumores de Vías Biliares (ATUVIBI), la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN), la Asociación Peritoneum y la Federación Española del Hígado (FEH), celebrado con el aval científico de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el Grupo de Tratamiento de Tumores Digestivos (Grupo TTD), la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

La doctora Ángela Lamarca, on-

cóloga médica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, insistió en que, en algunos subtipos de cáncer, el diagnóstico sigue llegando tarde, con enfermedad avanzada, y señaló el aumento de casos en población joven como «un punto prioritario de investigación» de cara al futuro.

Se abordaron, además, las dificultades que rodean al proceso diagnóstico –demoras en la derivación, síntomas inespecíficos no siempre conducentes a las pruebas adecuadas, y la creciente presencia de la inteligencia artificial como herramienta con la que los pacientes buscan información. ■

Shutterstock