



Pancrea Pharma

COMPOSICION

Celulasa, 30 mg, Proteasa, 30 mg, Alfa-amilasa, 15 mg
Lactasa, 15 mg, Lipasa, 15 mg.

PROPIEDADES

Amilasa: Descompone el almidón en azúcares simples que pueden ser absorbidos en el intestino. Los animales deficitarios en amilasa padecen diarreas de tipo osmótico por la elevada concentración de almidón sin digerir en el colon.

Lipasa: La lipasa participa, junto con la bilis, en el proceso de digestión y descomposición de las moléculas de grasa, permitiendo su absorción intestinal en forma de moléculas utilizables por el organismo. Su deficiencia causa mala digestión y mala absorción de las grasas. Como consecuencia de una mala absorción de los lípidos se producen también episodios de mala absorción de vitaminas liposolubles.

Proteasa: Descompone las proteínas, posibilitando su absorción. También ayudan a mantener el intestino libre de patógenos como parásitos, protozoos, bacterias y levaduras.

Su déficit provoca digestión incompleta de las proteínas dando lugar a alteraciones por falta de proteínas, favorece la aparición de alergias y sustancias tóxicas y aumenta el riesgo de infecciones intestinales.

Las enzimas no solo son responsables del proceso digestivo. También tienen efecto analgésico en traumatismos de tejidos blandos. Las enzimas juegan un papel primordial en el mantenimiento de la salud y el funcionamiento del organismo.

Es importante considerar el uso de las enzimas como apoyo en las enfermedades crónicas de la piel, pues muchas veces cursan con problemas de mala absorción.

INDICACIONES

Añadido a la dieta habitual, ayuda a una mejor asimilación de los alimentos siendo especialmente beneficiosa en animales geriátricos o afectados de problemas digestivos como:

- Halitosis.
- Diarrea.
- Pancreatitis exocrina.
- Síndrome de mala absorción.
- Enfermedades crónicas de piel (muchas veces se dan en procesos de mala absorción).
- Flatulencia.
- Coprofagia.
- Insuficiencia pancreática.

En el síndrome de mala absorción recomendamos mezclar con comida blanda media hora antes de la ingesta. La dosis se puede incrementar paulatinamente hasta obtener el efecto deseado.

MODO DE EMPLEO/DOSIFICACIÓN

Vía oral. Perros y gatos: 1 comprimido por cada 10 Kg. de peso 2 veces al día. (antes de las comidas).

PRESENTACIÓN

Caja con blister de 60 comprimidos

