

Informatiebrochure Cataract

1. **Wat is cataract?**

De doorschijnende lens in het menselijk oog bevindt zich achter de pupil. De functie van deze lens is om het licht te concentreren op het netvlies. Men spreekt van cataract (staar) wanneer de lens troebel, en de beelden wazig worden. (oorzaken: ouderdom, diabetes, cortisone gebruik...)

Cataract ontwikkelt zich meestal zeer geleidelijk aan over jaren maar soms kan het proces sneller gaan, vooral het zicht in de verte wordt waziger met lichtschuwheid)

Behandeling: Er bestaat geen medicatie die cataract kan voorkomen of behandelen. De enige behandeling is een chirurgische ingreep waarbij men via een heel kleine snede in het oog de troebele lens van de patiënt verwijdert en vervangt door een kunstlens (het lensimplant).

Resultaat op lange termijn: De kunstlens moet normaal gezien nooit meer vervangen worden. Bij een derde van de patiënten kan het lenzakje waarin de kunstlens geplaatst wordt ook troebel worden, maanden of jaren na de ingreep (secundaire cataract of nastaar, kan vlot behandeld worden met laser).

Verwikkelingen: Belangrijke verwikkelingen bij een cataractingreep zijn zeer zeldzaam, maar zij kunnen soms een nieuwe ingreep noodzakelijk maken.

De voornaamste ernstige verwikkelingen zijn infectie, bloeding in het oog, zwelling van het hoornvlies of het centrale netvlies, netvliesloslating, een scheurtje in het lenzakje (met glasvochtverlies)

Andere minder ernstige verwikkelingen zijn o.a vertraagde heling van de insnede, voorbijgaande bloeditstorting van het oogwit of ooglid, allergie op de oogdruppels, het waarnemen van 'vliegjes', overgevoeligheid voor licht, lichte ontstekingen van het oog, verhoogde oogdruk, astigmatisme (vervorming van het hoornvlies)....

2. **Het verloop van de ingreep.**

Verdoving: de meeste cataractoperaties worden gedaan onder lokale verdoving door middel van druppels. De druppels worden toegediend net voor de ingreep. Tijdens de ingreep kan de patiënt dan nog wat zien en merkt hij wel dat de chirurg bezig is maar voelt geen pijn. Patiënten die erg zenuwachtig zijn kunnen een kalmeermiddel krijgen maar deze middelen mogen niet door de patiënt zelf ingenomen worden. In enkele uitzonderlijke gevallen kan de verdoving gebeuren via een inspuiting rond het oog. Algemene verdoving wordt enkel gedaan bij grote uitzonderingen op medische indicatie.

Daghospitalisatie of hospitalisatie; de meeste cataractoperaties gebeuren in het daghospitaal waarbij de patiënt gedurende 3 uur in het ziekenhuis verblijft. In speciale gevallen kan me hospitalisatie overwegen.

3. **Kosten van een cataractingreep**

Een tweetal maanden na de ingreep stuurt het daghospitaal een factuur op met de details van de kostenstructuur: de verblijfskosten van de dagchirurgie, de gebruikte medicatie en wegwerpmateriaal, de implantlens (die voor een deel terugbetaald wordt door het RIZIV), diverse kosten.

Bij elke bedrag wordt vermeld wat en laste valt van het RIZIV en wat ten laste valt van de patiënt. De totale kostprijs voor iedere patiënt in ons land komt zo bij benadering op 350 euro. Indien u een hospitalisatieverzekering heeft zal deze waarschijnlijk instaan voor dit bedrag.

Nb: de operatie zelf wordt volledig terugbetaald door het Riziv (= het honorarium van de oogarts)

4. Praktische informatie

Breng mee: identiteitskaart, hospitalisatiedocumenten van de verzekering, en verslag van huisarts.

Bloedverdunningsmiddelen moeten niet gestopt worden, U moet nuchter zijn vanaf middernacht de avond ervoor en alle medicatie mag verder worden genomen de ochtend van de ingreep met een beetje water.

De dag van de ingreep.

De operatie zal gebeuren door oogarts Dr. De Brauwer in Brussel in de ONE-DAY CLINIC (Clinique de la Basilique) adres: Pangaertstraat 45-47, 1083 Ganshoren U krijgt een wegbeschrijving mee van Diest naar het ziekenhuis te Brussel

U mag zelf niet naar huis rijden na de ingreep en ook niet de dag erna.

Na de operatie ontvangt u van de verpleging de medicatie die nodig is als nazorg van de ingreep.

Nazorg

Lichte pijn of ongemak is niet abnormaal na de ingreep. Hierdoor kan 1 of 2 tabletten paracetamol ingenomen worden. Bij hevige pijn of ongerustheid kan u steeds contact opnemen met uw oogarts.

Vermijd water en stof in de ogen gedurende 1 week na de ingreep en doe geen zware fysieke inspanningen.

Het zicht en eventuele ongemakken zullen geleidelijk verbeteren in de weken na de ingreep.

Als het zicht echter duidelijk achteruitgaat, het oog roder of pijnlijker wordt, moet u onmiddellijk een oogarts raadplegen...dit kan o.a wijzen op een ernstige infectie.

Een maand na de ingreep kan er een nieuwe bril voorgeschreven worden.

Ik,ondergetekende, verklaar dat de aard van de risico's van de voorgestelde ingreep mij mondeling werden uiteengezet in door mij verstande bewoordingen en dat mij een bevredigend antwoord werd gegeven op alle gestelde vragen. Mij werd voldoende bedenktijd gegeven en ik geef hierbij mijn toestemming tot het uitvoeren van de voorgestelde ingreep

Handtekening

Datum.