



















# 『Fasciaの評価と治療 解剖・動作・エコーで導く Fasciaリリースの基本と臨床 第2版』

## 正誤表

本書におきまして、下記の通り記載内容に誤りがございました。訂正してお詫びいたします。  
(第1刷)

頁	該当箇所																																																																							
100	表1 fascia ハイドロリリースとハイドロダイセクション、神経ブロックの使用目的の比較																																																																							
<b>誤 (下記赤枠内) 神経</b>																																																																								
<p><b>表1</b> fascia ハイドロリリースとハイドロダイセクション、神経ブロックの使用目的の比較</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手技の名称</th> <th colspan="4">hydrorelease of fascia/nerve/vessel fascia (fibrils 含む)/末梢神経/血管に対するハイドロリリース</th> <th>hydrodissection (of nerve)</th> <th>神経ブロック</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>代表的な 症状・病態</td> <td>痛み・しびれ感</td> <td>知覚過敏 (痛み・しびれ感)</td> <td>知覚過敏 アロディニア</td> <td>痛み・しびれ感 (冷え感・むくみ)</td> <td>神経機能低下 (知覚鈍麻・麻痺) entrapment syndrome</td> <td>神経機能低下 (知覚鈍麻・麻痺) entrapment syndrome</td> <td>手術/処置時</td> </tr> <tr> <td>エコー所見</td> <td> stacking fascia N or N</td> <td> 末梢神経上膜 N</td> <td> 浮腫 N</td> <td> stacking fascia V or V</td> <td> stacking fascia N 骨など</td> <td> fasciae, ligaments, tendons など N 骨など</td> <td> 傍神経鞘 N 神経上膜</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stacking fascia が神経より離れた、または神経と接する。神経と周囲組織の滑走性の低下</td> <td>末梢神経内に stacking fascia があり、末梢神経は楕円形である</td> <td>末梢神経に stacking fascia、かつ神経自体の浮腫で末梢神経自体が正円に近いしている</td> <td>stacking fascia が神経より離れた、または神経と接する。神経と周囲組織の滑走性の低下</td> <td>骨など硬い構造物と stacking fascia に圧排・絞扼された末梢神経が楕円形にひしゃげている</td> <td>骨など硬い構造物と stacking fascia に圧排・絞扼された末梢神経が楕円形にひしゃげている</td> <td>特になし</td> </tr> <tr> <td>注射手技</td> <td> 注射前の様子 治療点=矢印の先端 ↓ 注射後の様子</td> <td> stacking fascia</td> <td> stacking fascia</td> <td> stacking fascia</td> <td> stacking fascia</td> <td> 骨など</td> <td> 骨など</td> </tr> <tr> <td>サイン名称</td> <td>ミルフィーユサイン mille-feuille sign</td> <td>フラワーサイン flower sign</td> <td>フラワーサイン flower sign</td> <td>ミルフィーユサイン mille-feuille sign</td> <td>ミルフィーユサイン mille-feuille sign</td> <td>ドーナツサイン donut sign</td> <td>ドーナツサイン donut sign</td> </tr> <tr> <td>薬液</td> <td>主な種類 生理食塩水など</td> <td>生理食塩水など</td> <td>生理食塩水など</td> <td>生理食塩水など</td> <td>生理食塩水など</td> <td>生理食塩水など</td> <td>局所麻酔薬</td> </tr> <tr> <td></td> <td>使用量 1~5mL</td> <td>0.5~1mL</td> <td>0.5~1mL</td> <td>1~5mL</td> <td>1~5mL</td> <td>10~50mL (high-volume HD)</td> <td>1~5mL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ステロイド薬 -</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>↓: 注射針 : stacking fascia : 切離対象としての結合組織 : nerve エコーで確認できる末梢神経 : vessel エコーで確認できる血管(動脈・静脈) (日本整形内科学研究会ホームページ: 4-9-2 エコーガイドド fascia ハイドロリリース US-FHR、ハイドロダイセクション(HD)、神経ブロックの差異より転載、一部改変 <a href="https://www.jnos.or.jp/for_medical">https://www.jnos.or.jp/for_medical</a>)</p>		手技の名称	hydrorelease of fascia/nerve/vessel fascia (fibrils 含む)/末梢神経/血管に対するハイドロリリース				hydrodissection (of nerve)	神経ブロック	代表的な 症状・病態	痛み・しびれ感	知覚過敏 (痛み・しびれ感)	知覚過敏 アロディニア	痛み・しびれ感 (冷え感・むくみ)	神経機能低下 (知覚鈍麻・麻痺) entrapment syndrome	神経機能低下 (知覚鈍麻・麻痺) entrapment syndrome	手術/処置時	エコー所見	 stacking fascia N or N	 末梢神経上膜 N	 浮腫 N	 stacking fascia V or V	 stacking fascia N 骨など	 fasciae, ligaments, tendons など N 骨など	 傍神経鞘 N 神経上膜		stacking fascia が神経より離れた、または神経と接する。神経と周囲組織の滑走性の低下	末梢神経内に stacking fascia があり、末梢神経は楕円形である	末梢神経に stacking fascia、かつ神経自体の浮腫で末梢神経自体が正円に近いしている	stacking fascia が神経より離れた、または神経と接する。神経と周囲組織の滑走性の低下	骨など硬い構造物と stacking fascia に圧排・絞扼された末梢神経が楕円形にひしゃげている	骨など硬い構造物と stacking fascia に圧排・絞扼された末梢神経が楕円形にひしゃげている	特になし	注射手技	 注射前の様子 治療点=矢印の先端 ↓ 注射後の様子	 stacking fascia	 stacking fascia	 stacking fascia	 stacking fascia	 骨など	 骨など	サイン名称	ミルフィーユサイン mille-feuille sign	フラワーサイン flower sign	フラワーサイン flower sign	ミルフィーユサイン mille-feuille sign	ミルフィーユサイン mille-feuille sign	ドーナツサイン donut sign	ドーナツサイン donut sign	薬液	主な種類 生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	局所麻酔薬		使用量 1~5mL	0.5~1mL	0.5~1mL	1~5mL	1~5mL	10~50mL (high-volume HD)	1~5mL		ステロイド薬 -	-	+	-	-	-	-
手技の名称	hydrorelease of fascia/nerve/vessel fascia (fibrils 含む)/末梢神経/血管に対するハイドロリリース				hydrodissection (of nerve)	神経ブロック																																																																		
代表的な 症状・病態	痛み・しびれ感	知覚過敏 (痛み・しびれ感)	知覚過敏 アロディニア	痛み・しびれ感 (冷え感・むくみ)	神経機能低下 (知覚鈍麻・麻痺) entrapment syndrome	神経機能低下 (知覚鈍麻・麻痺) entrapment syndrome	手術/処置時																																																																	
エコー所見	 stacking fascia N or N	 末梢神経上膜 N	 浮腫 N	 stacking fascia V or V	 stacking fascia N 骨など	 fasciae, ligaments, tendons など N 骨など	 傍神経鞘 N 神経上膜																																																																	
	stacking fascia が神経より離れた、または神経と接する。神経と周囲組織の滑走性の低下	末梢神経内に stacking fascia があり、末梢神経は楕円形である	末梢神経に stacking fascia、かつ神経自体の浮腫で末梢神経自体が正円に近いしている	stacking fascia が神経より離れた、または神経と接する。神経と周囲組織の滑走性の低下	骨など硬い構造物と stacking fascia に圧排・絞扼された末梢神経が楕円形にひしゃげている	骨など硬い構造物と stacking fascia に圧排・絞扼された末梢神経が楕円形にひしゃげている	特になし																																																																	
注射手技	 注射前の様子 治療点=矢印の先端 ↓ 注射後の様子	 stacking fascia	 stacking fascia	 stacking fascia	 stacking fascia	 骨など	 骨など																																																																	
サイン名称	ミルフィーユサイン mille-feuille sign	フラワーサイン flower sign	フラワーサイン flower sign	ミルフィーユサイン mille-feuille sign	ミルフィーユサイン mille-feuille sign	ドーナツサイン donut sign	ドーナツサイン donut sign																																																																	
薬液	主な種類 生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	局所麻酔薬																																																																	
	使用量 1~5mL	0.5~1mL	0.5~1mL	1~5mL	1~5mL	10~50mL (high-volume HD)	1~5mL																																																																	
	ステロイド薬 -	-	+	-	-	-	-																																																																	
<b>正 (下記赤枠内) 血管</b>																																																																								
<p><b>表1</b> fascia ハイドロリリースとハイドロダイセクション、神経ブロックの使用目的の比較</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手技の名称</th> <th colspan="4">hydrorelease of fascia/nerve/vessel fascia (fibrils 含む)/末梢神経/血管に対するハイドロリリース</th> <th>hydrodissection (of nerve)</th> <th>神経ブロック</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>代表的な 症状・病態</td> <td>痛み・しびれ感</td> <td>知覚過敏 (痛み・しびれ感)</td> <td>知覚過敏 アロディニア</td> <td>痛み・しびれ感 (冷え感・むくみ)</td> <td>神経機能低下 (知覚鈍麻・麻痺) entrapment syndrome</td> <td>神経機能低下 (知覚鈍麻・麻痺) entrapment syndrome</td> <td>手術/処置時</td> </tr> <tr> <td>エコー所見</td> <td> stacking fascia N or N</td> <td> 末梢神経上膜 N</td> <td> 浮腫 N</td> <td> stacking fascia V or V</td> <td> stacking fascia N 骨など</td> <td> fasciae, ligaments, tendons など N 骨など</td> <td> 傍神経鞘 N 神経上膜</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stacking fascia が神経より離れた、または神経と接する。神経と周囲組織の滑走性の低下</td> <td>末梢神経内に stacking fascia があり、末梢神経は楕円形である</td> <td>末梢神経に stacking fascia、かつ神経自体の浮腫で末梢神経自体が正円に近いしている</td> <td>stacking fascia が血管より離れた、または血管と接する。血管と周囲組織の滑走性の低下</td> <td>骨など硬い構造物と stacking fascia に圧排・絞扼された末梢神経が楕円形にひしゃげている</td> <td>骨など硬い構造物と stacking fascia に圧排・絞扼された末梢神経が楕円形にひしゃげている</td> <td>特になし</td> </tr> <tr> <td>注射手技</td> <td> 注射前の様子 治療点=矢印の先端 ↓ 注射後の様子</td> <td> stacking fascia</td> <td> stacking fascia</td> <td> stacking fascia</td> <td> stacking fascia</td> <td> 骨など</td> <td> 骨など</td> </tr> <tr> <td>サイン名称</td> <td>ミルフィーユサイン mille-feuille sign</td> <td>フラワーサイン flower sign</td> <td>フラワーサイン flower sign</td> <td>ミルフィーユサイン mille-feuille sign</td> <td>ミルフィーユサイン mille-feuille sign</td> <td>ドーナツサイン donut sign</td> <td>ドーナツサイン donut sign</td> </tr> <tr> <td>薬液</td> <td>主な種類 生理食塩水など</td> <td>生理食塩水など</td> <td>生理食塩水など</td> <td>生理食塩水など</td> <td>生理食塩水など</td> <td>生理食塩水など</td> <td>局所麻酔薬</td> </tr> <tr> <td></td> <td>使用量 1~5mL</td> <td>0.5~1mL</td> <td>0.5~1mL</td> <td>1~5mL</td> <td>1~5mL</td> <td>10~50mL (high-volume HD)</td> <td>1~5mL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ステロイド薬 -</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>↓: 注射針 : stacking fascia : 切離対象としての結合組織 : nerve エコーで確認できる末梢神経 : vessel エコーで確認できる血管(動脈・静脈) (日本整形内科学研究会ホームページ: 4-9-2 エコーガイドド fascia ハイドロリリース US-FHR、ハイドロダイセクション(HD)、神経ブロックの差異より転載、一部改変 <a href="https://www.jnos.or.jp/for_medical">https://www.jnos.or.jp/for_medical</a>)</p>		手技の名称	hydrorelease of fascia/nerve/vessel fascia (fibrils 含む)/末梢神経/血管に対するハイドロリリース				hydrodissection (of nerve)	神経ブロック	代表的な 症状・病態	痛み・しびれ感	知覚過敏 (痛み・しびれ感)	知覚過敏 アロディニア	痛み・しびれ感 (冷え感・むくみ)	神経機能低下 (知覚鈍麻・麻痺) entrapment syndrome	神経機能低下 (知覚鈍麻・麻痺) entrapment syndrome	手術/処置時	エコー所見	 stacking fascia N or N	 末梢神経上膜 N	 浮腫 N	 stacking fascia V or V	 stacking fascia N 骨など	 fasciae, ligaments, tendons など N 骨など	 傍神経鞘 N 神経上膜		stacking fascia が神経より離れた、または神経と接する。神経と周囲組織の滑走性の低下	末梢神経内に stacking fascia があり、末梢神経は楕円形である	末梢神経に stacking fascia、かつ神経自体の浮腫で末梢神経自体が正円に近いしている	stacking fascia が血管より離れた、または血管と接する。血管と周囲組織の滑走性の低下	骨など硬い構造物と stacking fascia に圧排・絞扼された末梢神経が楕円形にひしゃげている	骨など硬い構造物と stacking fascia に圧排・絞扼された末梢神経が楕円形にひしゃげている	特になし	注射手技	 注射前の様子 治療点=矢印の先端 ↓ 注射後の様子	 stacking fascia	 stacking fascia	 stacking fascia	 stacking fascia	 骨など	 骨など	サイン名称	ミルフィーユサイン mille-feuille sign	フラワーサイン flower sign	フラワーサイン flower sign	ミルフィーユサイン mille-feuille sign	ミルフィーユサイン mille-feuille sign	ドーナツサイン donut sign	ドーナツサイン donut sign	薬液	主な種類 生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	局所麻酔薬		使用量 1~5mL	0.5~1mL	0.5~1mL	1~5mL	1~5mL	10~50mL (high-volume HD)	1~5mL		ステロイド薬 -	-	+	-	-	-	-
手技の名称	hydrorelease of fascia/nerve/vessel fascia (fibrils 含む)/末梢神経/血管に対するハイドロリリース				hydrodissection (of nerve)	神経ブロック																																																																		
代表的な 症状・病態	痛み・しびれ感	知覚過敏 (痛み・しびれ感)	知覚過敏 アロディニア	痛み・しびれ感 (冷え感・むくみ)	神経機能低下 (知覚鈍麻・麻痺) entrapment syndrome	神経機能低下 (知覚鈍麻・麻痺) entrapment syndrome	手術/処置時																																																																	
エコー所見	 stacking fascia N or N	 末梢神経上膜 N	 浮腫 N	 stacking fascia V or V	 stacking fascia N 骨など	 fasciae, ligaments, tendons など N 骨など	 傍神経鞘 N 神経上膜																																																																	
	stacking fascia が神経より離れた、または神経と接する。神経と周囲組織の滑走性の低下	末梢神経内に stacking fascia があり、末梢神経は楕円形である	末梢神経に stacking fascia、かつ神経自体の浮腫で末梢神経自体が正円に近いしている	stacking fascia が血管より離れた、または血管と接する。血管と周囲組織の滑走性の低下	骨など硬い構造物と stacking fascia に圧排・絞扼された末梢神経が楕円形にひしゃげている	骨など硬い構造物と stacking fascia に圧排・絞扼された末梢神経が楕円形にひしゃげている	特になし																																																																	
注射手技	 注射前の様子 治療点=矢印の先端 ↓ 注射後の様子	 stacking fascia	 stacking fascia	 stacking fascia	 stacking fascia	 骨など	 骨など																																																																	
サイン名称	ミルフィーユサイン mille-feuille sign	フラワーサイン flower sign	フラワーサイン flower sign	ミルフィーユサイン mille-feuille sign	ミルフィーユサイン mille-feuille sign	ドーナツサイン donut sign	ドーナツサイン donut sign																																																																	
薬液	主な種類 生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	生理食塩水など	局所麻酔薬																																																																	
	使用量 1~5mL	0.5~1mL	0.5~1mL	1~5mL	1~5mL	10~50mL (high-volume HD)	1~5mL																																																																	
	ステロイド薬 -	-	+	-	-	-	-																																																																	