

『がん研有明病院薬剤部が作った がん薬物療法ABCハンドブック』

正 誤 表

本書におきまして、下記の通り記載内容に誤りがございました。訂正してお詫びいたします。

(2024 年 3 月 6 日作成, 2025 年 7 月 10 日更新)

刷	頁	該当箇所	誤	正	更新日																																																																		
1 刷	8	CAPOX 療法の表	CAPOX 療法^{4,5)} 投与間隔：21 日，催吐リスク：中等度 <table><tr><th>薬剤名</th><th>投与量</th><th>投与方法</th><th>day 1</th><th>2~14</th><th>15~21</th></tr><tr><td>オキサリプラチン</td><td>130 mg/m²</td><td>点滴静注 30 分</td><td>●</td><td>●</td><td>—</td></tr><tr><td>カペシタビン</td><td>1,000 mg/m²</td><td>経口 1 日 2 回</td><td>●</td><td>●</td><td>—</td></tr></table>	薬剤名	投与量	投与方法	day 1	2~14	15~21	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 30 分	●	●	—	カペシタビン	1,000 mg/m ²	経口 1 日 2 回	●	●	—	CAPOX 療法^{4,5)} 投与間隔：21 日，催吐リスク：中等度 <table><tr><th>薬剤名</th><th>投与量</th><th>投与方法</th><th>day 1</th><th>2~14</th><th>15~21</th></tr><tr><td>オキサリプラチン</td><td>130 mg/m²</td><td>点滴静注 30 分</td><td>●</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>カペシタビン</td><td>1,000 mg/m²</td><td>経口 1 日 2 回</td><td>●</td><td>●</td><td>—</td></tr></table>	薬剤名	投与量	投与方法	day 1	2~14	15~21	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 30 分	●	—	—	カペシタビン	1,000 mg/m ²	経口 1 日 2 回	●	●	—	2025/7/10																														
薬剤名	投与量	投与方法	day 1	2~14	15~21																																																																		
オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 30 分	●	●	—																																																																		
カペシタビン	1,000 mg/m ²	経口 1 日 2 回	●	●	—																																																																		
薬剤名	投与量	投与方法	day 1	2~14	15~21																																																																		
オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 30 分	●	—	—																																																																		
カペシタビン	1,000 mg/m ²	経口 1 日 2 回	●	●	—																																																																		
〃	191	表 1 のつづき	軽度催吐リスク サツキシマブ，イデカブタゲン ビクルユーセル，エトボシド，エリブリン，エロツズマブ，エンホルツマブ ベドチン，カバジタキセル，カルフィルゾミブ，ゲムシタピン，ゲムツズマブ オゾガマイシン，シタラビン (≤ 1,000 mg/m²)，チサゲンレクルユーセル，テムシロリムス，ドキソルビシン リボソーム，ドセタキセル，トラスツズマブ エムタンシン，ニムスチン，ネシツムマブ，ネララビン，ノギテカン，パクリタキセル，パクリタキセル アルブミン懸濁型，プリナツモマブ，5-FU，プレントキシマブ ベドチン，ベメトレキセド，ペントスタチン，ボルテゾミブ，マイトマイシンC，ミトキサントロン，メトトレキサート (50 mg/m²<，< 250 mg/m²)，モガムリズマブ，ラニムスチン，リソカブタゲン マラルユーセル 最小度催吐リスク L-アスパラギナーゼ，アフリベルセプト ベータ，アベルマブ，イビリムマブ，オビヌツズマブ，クラドリビン，セツキシマブ，セツキシマブ サロタロカン，セミブリマブ，ダラツムマブ，ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ，タラボルフィン，ダリナバルシン，デニロイキン ジフチトクス，デュルバルマブ，トラスツズマブ，トレメリムマブ，ニボルマブ，パニツムマブ，ビノレルビン，ピンクリスチン，ビンデシン，ビンブラスチン，プララトレキサート，フルダラビン，プレオマイシン，ペバシズマブ，ペプロマイシン，ベルツズマブ，ペムプロリズマブ，ボラツズマブ ベドチン，メトトレキサート (≤ 50 mg/m²)，ラムシルマブ，リツキシマブ	軽度催吐リスク <u>アキシカブタゲン シロルユーセル，アテゾリズマブ，イ</u>サツキシマブ，イデカブタゲン ビクルユーセル，エトボシド，エリブリン，エロツズマブ，エンホルツマブ ベドチン，カバジタキセル，カルフィルゾミブ，ゲムシタピン，ゲムツズマブ オゾガマイシン，シタラビン (≤ 1,000 mg/m²)，チサゲンレクルユーセル，テムシロリムス，ドキソルビシン リボソーム，ドセタキセル，トラスツズマブ エムタンシン，ニムスチン，ネシツムマブ，ネララビン，ノギテカン，パクリタキセル，パクリタキセル アルブミン懸濁型，プリナツモマブ，5-FU，プレントキシマブ ベドチン，ベメトレキセド，ペントスタチン，ボルテゾミブ，マイトマイシンC，ミトキサントロン，メトトレキサート (50 mg/m²<，< 250 mg/m²)，モガムリズマブ，ラニムスチン，リソカブタゲン マラルユーセル 最小度催吐リスク L-アスパラギナーゼ，アフリベルセプト ベータ，アベルマブ，イビリムマブ，オビヌツズマブ，クラドリビン，セツキシマブ，セツキシマブ サロタロカン，セミブリマブ，ダラツムマブ，ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ，タラボルフィン，ダリナバルシン，デニロイキン ジフチトクス，デュルバルマブ，トラスツズマブ，トレメリムマブ，ニボルマブ，パニツムマブ，ビノレルビン，ピンクリスチン，ビンデシン，ビンブラスチン，プララトレキサート，フルダラビン，プレオマイシン，ペバシズマブ，ペプロマイシン，ベルツズマブ，ペムプロリズマブ，ボラツズマブ ベドチン，メトトレキサート (≤ 50 mg/m²)，ラムシルマブ，リツキシマブ	2024/3/6																																																																		
〃	193	表 3	表 3 高度催吐リスクの注射抗がん薬に対する制吐療法 <table><tr><th></th><th>day 1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>5-HT₃ 受容体拮抗薬</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>アプレピタント</td><td>125 mg</td><td>80 mg</td><td>80 mg</td><td></td><td></td></tr><tr><td>または 静注 NK₁ 受容体拮抗薬</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>デキサメタゾン</td><td>9.9 mg 8 mg</td><td>8 mg 8 mg</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		day 1	2	3	4	5	5-HT ₃ 受容体拮抗薬	●					アプレピタント	125 mg	80 mg	80 mg			または 静注 NK ₁ 受容体拮抗薬	●					デキサメタゾン	9.9 mg 8 mg	8 mg 8 mg				表 3 高度催吐リスクの注射抗がん薬に対する制吐療法 <table><tr><th></th><th>day 1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>5-HT₃ 受容体拮抗薬</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>アプレピタント</td><td>125 mg</td><td>80 mg</td><td>80 mg</td><td></td><td></td></tr><tr><td>または 静注 NK₁ 受容体拮抗薬</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>デキサメタゾン</td><td>9.9 mg 8 mg</td><td>8 mg 8 mg</td><td>8 mg 8 mg</td><td></td><td></td></tr><tr><td>オランザピン</td><td>5 mg</td><td>5 mg</td><td>5 mg</td><td>5 mg</td><td></td></tr></table>		day 1	2	3	4	5	5-HT ₃ 受容体拮抗薬	●					アプレピタント	125 mg	80 mg	80 mg			または 静注 NK ₁ 受容体拮抗薬	●					デキサメタゾン	9.9 mg 8 mg	8 mg 8 mg	8 mg 8 mg			オランザピン	5 mg	5 mg	5 mg	5 mg		〃
	day 1	2	3	4	5																																																																		
5-HT ₃ 受容体拮抗薬	●																																																																						
アプレピタント	125 mg	80 mg	80 mg																																																																				
または 静注 NK ₁ 受容体拮抗薬	●																																																																						
デキサメタゾン	9.9 mg 8 mg	8 mg 8 mg																																																																					
	day 1	2	3	4	5																																																																		
5-HT ₃ 受容体拮抗薬	●																																																																						
アプレピタント	125 mg	80 mg	80 mg																																																																				
または 静注 NK ₁ 受容体拮抗薬	●																																																																						
デキサメタゾン	9.9 mg 8 mg	8 mg 8 mg	8 mg 8 mg																																																																				
オランザピン	5 mg	5 mg	5 mg	5 mg																																																																			

刷	頁	該当箇所	誤	正	更新日																																																																															
1 刷	193	表 4	表 4 中等度催吐リスクの注射抗がん薬に対する制吐療法 <table><tr><th></th><th>day 1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>5-HT₃ 受容体拮抗薬*</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>デキサメタゾン</td><td>9.9 mg</td><td>8 mg</td><td>8 mg</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">オプション</td><td>5-HT₃ 受容体拮抗薬</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>アプレビタント</td><td>125 mg</td><td>80 mg</td><td>80 mg</td><td></td></tr><tr><td>または 静注 NK₁ 受容体拮抗薬</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>デキサメタゾン</td><td>4.95 mg</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> *パロノセトロンが推奨されるが、NK₁ 受容体拮抗薬を用いる場合は、第 1 世代の 5-HT₃ 受容体拮抗薬を選択してもよい。 **パロノセトロンを使用する場合は、2～3 日目のデキサメタゾンを省略可能。 オプションは、カルボプラチン（パブラチン[®] 注）AUC 4 ≧投与時または、カルボプラチン以外の抗がん薬において、2 剤併用療法では悪心が十分に制御できない場合である。		day 1	2	3	4	5	5-HT ₃ 受容体拮抗薬*	●					デキサメタゾン	9.9 mg	8 mg	8 mg			オプション	5-HT ₃ 受容体拮抗薬	●				アプレビタント	125 mg	80 mg	80 mg		または 静注 NK ₁ 受容体拮抗薬	●				デキサメタゾン	4.95 mg				表 4 中等度催吐リスクの注射抗がん薬に対する制吐療法 <table><tr><th></th><th>day 1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>5-HT₃ 受容体拮抗薬*</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>デキサメタゾン</td><td>9.9 mg</td><td>8 mg**</td><td>8 mg**</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">オプション</td><td>5-HT₃ 受容体拮抗薬*</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>アプレビタント</td><td>125 mg</td><td>80 mg</td><td>80 mg</td><td></td></tr><tr><td>または 静注 NK₁ 受容体拮抗薬</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>デキサメタゾン</td><td>4.95 mg</td><td>(4 mg)</td><td>(4 mg)</td><td></td><td></td></tr></table> オプションは、カルボプラチン（パブラチン[®] 注）AUC 4 ≧投与時または、カルボプラチン以外の抗がん薬において、2 剤併用療法では悪心が十分に制御できない場合である。 *パロノセトロンが推奨されるが、NK₁ 受容体拮抗薬を用いる場合は、第 1 世代の 5-HT₃ 受容体拮抗薬を選択してもよい。 **パロノセトロンを使用する場合は、2～3 日目のデキサメタゾンを省略可能。2～3 日目のデキサメタゾンを積極的に使用できない場合は、代わりに 5-HT₃ 受容体拮抗薬を投与してもよい。		day 1	2	3	4	5	5-HT ₃ 受容体拮抗薬*	●					デキサメタゾン	9.9 mg	8 mg**	8 mg**			オプション	5-HT ₃ 受容体拮抗薬*	●				アプレビタント	125 mg	80 mg	80 mg		または 静注 NK ₁ 受容体拮抗薬	●				デキサメタゾン	4.95 mg	(4 mg)	(4 mg)			2024/3/6
	day 1	2	3	4	5																																																																															
5-HT ₃ 受容体拮抗薬*	●																																																																																			
デキサメタゾン	9.9 mg	8 mg	8 mg																																																																																	
オプション	5-HT ₃ 受容体拮抗薬	●																																																																																		
	アプレビタント	125 mg	80 mg	80 mg																																																																																
	または 静注 NK ₁ 受容体拮抗薬	●																																																																																		
	デキサメタゾン	4.95 mg																																																																																		
	day 1	2	3	4	5																																																																															
5-HT ₃ 受容体拮抗薬*	●																																																																																			
デキサメタゾン	9.9 mg	8 mg**	8 mg**																																																																																	
オプション	5-HT ₃ 受容体拮抗薬*	●																																																																																		
	アプレビタント	125 mg	80 mg	80 mg																																																																																
	または 静注 NK ₁ 受容体拮抗薬	●																																																																																		
	デキサメタゾン	4.95 mg	(4 mg)	(4 mg)																																																																																