



- AMBITI GEOMORFOLOGICI**
- 1 Zona dei rilievi a blocchi emergenti, con substrato roccioso poco profondo e copertura quaternaria. Morfologia a versanti acclivi con pendenza localmente più accentuata ed elementi geomorfologici di tipo glaciale. Presenza di aree a potenziale dissesto geomorfologico.
 - 2 Zone rilevate a blocchi emergenti, con versanti a media pendenza, localmente più acclivi, ed elementi geomorfologici di tipo glaciale. Impiuvii con ruscellamento di tipo meteorico.
 - 3 Resti di cordoni morenici. Dossi orientati ed allungati ad acclività bassa con elementi geomorfologici di tipo glaciale.
 - 4 Pianori terrazzati a coronamento delle zone dei rilievi, a morfologia monotona, da subpianeggiante a pianeggiante ondulata con terrazzamenti naturali e antropici. Presenza di aree di alluvionamento occasionali e ristagno idrico.
 - 5 Aree di versante di raccordo tra le zone rilevate e le zone di fondovalle, a configurazione morfologica regolare con settori localmente più acclivi.
 - 6 Aree pianeggianti a morfologia monotona con sporadici terrazzamenti, che si estende ai piedi dei rilievi collinari morenici. Presenza di aree di risorgenza e ristagni idrici occasionali.
 - 7 Depressioni in corrispondenza di avvallamenti intramontani, a morfologia pianeggiante o blandamente ondulata, limitate da aree più rilevate. Reticolo idrografico con canali di bonifica, fossi e ri, zone di risorgenza, ristagni e impaludamenti.
 - 8 Zone depresse limitate da aree più rilevate, ricoperte di acque superficiali con aree di alluvionamento occasionali, risorgive, ristagni e impaludamenti.
 - 9 Zona sopralcavale di raccordo con le zone terrazzate, poco sopravvinate rispetto al lago, a morfologia sub pianeggiante, senza canali di bonifica, fossi e ri, con zone di ristagno occasionale.
 - 10 Aree di transizione terraferma-lago, in condizioni di permanente alluvionabilità a vegetazione palustre (canonetti).
 - 11 Zone pianeggianti dei fondovalle del T. Strona ad ampiezza variabile, delimitate da terrazzi, costeggiate dalla zona d'alveo e dalle aree periferiche alluvionabili.

LEGENDA

- Linea tra i diversi ambiti geomorfologici
- FORME GLACIALI**
 - Cordone morenico
 - Principali massi erratici
- FORME FLUVIOGLACIALI, FLUVIALI E LACUSTRI**
 - Reticolo idrografico principale
 - Reticolo idrografico secondario
 - Orlo di terrazzo
 - Aree di alluvionamento occasionale
 - Zone di risorgenza diffusa
 - Laghi artificiali
 - Zona umida (canonetti) alimentata dal lago
 - Impiuvii con ruscellamento meteorico
 - Aree di ristagno idrico permanente
 - Aree di ristagno idrico occasionale
- FORME DI VERSANTE**
 - Orlo di scarpata
 - Aree con acclività compresa tra il 20 % e il 40 %
 - Aree con acclività superiore al 40 %
 - Aree a rischio di dissesto geomorfologico
- FORME ANTROPICHE**
 - Intubamento idrico sotterraneo - superficiale
 - Aree di riporto (tracciato autostradale)
 - Aree di cava dismesse
 - Aree ex-discardia autorizzata di RSU
 - Aree di spagliamento