

ピコトーニングを受ける方へ 説明・同意書

ピコ秒ネオジウム:ヤグレーザーを低出力で照射する治療は、メラノサイト内におけるメラノソームやケラチノサイト内のメラニン顆粒を光音響効果で破壊することで、色調や肝斑の改善が期待できます。照射直後に、極わずかな赤みがみられますが、ダウンタイムはほとんどありません。

◆治療が受けられない方

下記の病気や症状がある方、下記薬剤の使用中的の方は治療を受けられない場合があります。

- ◇光過敏症 ◇てんかん発作 ◇ケロイド・癬痕体質 ◇神経系疾患、心臓疾患、糖尿病
- ◇免疫不全症や免疫抑制剤使用 ◇抗凝固系薬剤使用 ◇傷の治りが悪い方
- ◇治療部位の癌 ◇治療部位の感染 ◇全身状態が不良 ◇癬痕化した刺青・色素性疾患
- ◇単純ヘルペスⅠ型、Ⅱ型の活動病変 ◇治療部位に血管系疾患、刺青、アートメイク
- ◇金属剤の使用歴がある方(金属剤は抗リウマチ薬の一種です) ◇金の糸が入っている方
- ◇プロテーゼなどの外科的手術をした部位及び周囲 ◇妊娠中・授乳中
- ◇抗リウマチ剤の金製剤を内服及び注射されている方、もしくは治療既往歴のある方
- ◇イソトレチノイン製剤(アキュテイン等)を内服、レチノイド類の外用薬を使用している場合は内服終了から3か月経過していないと施術できません

◆施術前注意事項

- ・ピーリング剤やトレチノイン、ディフェリン等の治療をされている方は2週間前から使用を中止してください(施術後の再開は刺激症状が消失し、かつ施術1週間を経過してからお願いします)

◆治療経過

- ・照射直後は照射部位全体に赤みや腫れが出ることもありますが、症状は3～4日で消失します。
- ・小さな点状出血斑が出た場合は、数日で消失します。

◆その他

- ・治療部位にお化粧品や日焼け止め等が残っていると、レーザー光を過剰に吸収してしまう可能性がある為照射前は綺麗に洗顔をしてください。
- ・治療中は目を守るため、専用のゴーグルを装着します。照射中は絶対に外さないようにしていただき直接レーザーを見ないようにしてください。
- ・照射後、色素斑や色調が一時的に濃くなる場合があります。
- ・治療間隔は1ヶ月となります。
(1クール10回程の施術回数が推奨されています)

◆施術後の注意点

- ・お化粧品は翌日から可能ですが赤みや腫れが消失してから行ってください
- ・シャワーは照射当日から可能ですが、入浴、飲酒、サウナ、激しい運動はお控えください
- ・照射後から数日間は刺激の強い化粧品や洗顔料などはお控えください
- ・施術後は肌の日焼けや、日焼けによるダメージを受けやすくなります。
SPF30以上の日焼け止めを使用してください。
- ・一時的に肌が乾燥しやすくなります。化粧水、乳液、クリーム等通常よりもしっかりと保湿を行ってください。低刺激のものを推奨します。

◆合併症

◇色素沈着 ◇色素脱失 ◇瘢痕形成 ◇水疱形成 ◇点状出血 ◇炎症 等

★3カ月以内の美容施術歴のある方は必ずご記入ください

()

Lumignon Clinic 多田 昌平

私は、上記治療について内容を理解し、治療を受けることに同意します

年 _____ 月 _____ 日 _____

氏名 _____