



Antihistamínicos

Pare/no tome estos medicamentos 10 días antes de la consulta:

Atarax, Vistaril, Hydroxizine (Marax)

Pare/no tome estos antihistamínicos orales 5-7 días antes de la consulta:

Allegra (Fexofenadina)	Xyzal (Levocetirizina)	Claritin (Loratadina)
Alavert (Loratadina)	Zyrtec (Cetirizina)	Clarinex (Desloratadine)

Parar/no tome estos antihistamínicos orales 5 días antes de la consulta:

Actifed (Triprolidina)	Antihist
Axid	Azatadine (Optimine, Trinalin)
Bromfed	Benadryl (Diphenhydramine)
Cabinoxamine (Rondec)	Chlopheniramine (Chlortrimeton)
Clemastine (Tavist)	Cyproheptadine (Periactin)
Deconamine	Dimenhydrinate (Dramamine)
Dimetapp	Diphenylpyraline (Hispril)
Doxylamine (Nyquil)	Drixoral
Dura-Tab	Flexeril (muscle relaxers)
Kronofed	Meclizine (Antivert)
Methdilazine (Tacaryl)	Naldecone
Novafed-A	Ornade
Pepcid (Famotidine)	Phenergan (Promethazine)
Phenindamine (Nolamine)	Pheniramine
Poly-Histine-D	Pyrlamine (Kronohist, Rynatan)
Tagament (cimetidine)	Tavist
Trimeprazine (Temaril)	Trinalin
Zantac (Ranitidine)	Valium (Lorazepam, Ativan, pastillas para dormir)

Pare estos aerosoles nasales/ gotas de ojos 5 días antes:

Afrin	Astepro
Astelin	Azelastine
Dymista	Patanase
Bepreve	Patanol
Pataday	Gotas para los ojos de venta libre

*Si no está seguro de si su medicamento contiene un antihistamínico, póngase en contacto con nuestra oficina.

No es *necesario* detener los siguientes medicamentos:

Corticosteroides orales (Prednisona, Medrol)	
Pseudoefedrina	Accolate (Zarfilukast)
Teofilina	Zyflo (Zileuton)
Singlair (Montelukast)	Atrovent (Ipratroprium Bromide)

Esteroides nasales:

Qnasl	Nasalide
Fluticasona (Flonase)	Nasacort

Esteroides de asma inhalado/Broncodilatadores:

Aerobid	Pulmicort
Flovent	QVAR
Advair	Symbicort
Dulera	Aerospan
Alvesco	Asmanex
Sulfato de albuterol (ProAir, Ventolin, Proventil)	
Levalbuterol (Xopenex)	

Antidepresivos ISRS:

Paxil (Paroxetina)	Zoloft (Sertralina)
Prozac (Fluoxetina)	Celexa (Citalopram)
Hydrobromide)	Lexapro (Escitalopram)
	Effexor (Venlafaxina)

Inhibidores de la bomba de protones:

Prilosec	Aciphex
Protonix	Prevacid
Nexium	

**Tenga en cuenta que esta no es una lista completa. Si no está seguro de si el medicamento que está tomando contiene un antihistamínico, póngase en contacto con nuestra oficina o su farmacia local.*

**Por favor, infórmenos si está tomando algún antidepresivo antes de hacer el examen de piel que pueden interferir con las pruebas cutáneas. Nunca deje de tomar antidepresivos sin consultar primero al médico prescriptor.*