

# DIAGNOSEREGELS

De terugbetaling van bepaalde prestaties door het ZIV wordt gekoppeld aan bepaalde diagnoseregels. **Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver om voldoende klinische gegevens en diagnostische criteria mee te delen op het voorschrift. Indien niet voldaan wordt aan de diagnoseregels worden de analyses aangerekend aan de patiënt.**

De belangrijkste diagnoseregels worden hier vermeld:

D01	<b>Glucose of andere reducerende suikers</b> en <b>totaal eiwit in urine</b> mogen alleen worden aangerekend als het kwalitatief opzoeken een positief resultaat heeft opgeleverd
D03	<b>Microalbumine in urine</b> mag enkel worden aangerekend voor een diabetespatiënt
D05	<b>PSA</b> mag maximaal 2 maal per jaar aangerekend worden als follow-up tijdens de behandeling
D06	<b>HCG</b> mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.
D08	<b>Immunotypering en immunofixatie</b> mogen enkel worden aangerekend indien een abnormale band wordt waargenomen bij de eiwitelektroforese
D17	Opzoeken van een specifieke verworven <b>stollingsinhibitor</b> mag enkel worden aangerekend indien de PT lager is dan 70% of indien het resultaat van de PTT of aPTT verlengd is
D18	<b>Factor II, V, VII, X</b> en het complex <b>VII+X</b> mogen enkel worden aangerekend indien de PTT lager is dan 70 %
D19	<b>Factor XI en XII</b> mogen enkel worden aangerekend indien de PTT of aPTT verlengd is
D20	<b>Antithrombine III (activiteit), proteïne C, proteïne S, plasminogeen</b> en <b>APC-resistentie</b> mogen alleen aangerekend worden bij patiënten van minder dan 55 jaar met een thrombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van recidiverende thrombosen of in geval van diffuse intravasale stolling
D21	<b>Factor VII</b> mag alleen worden aangerekend als het complex VII+X een resultaat geeft dat lager ligt dan 70 %
D22	<b>Reptilasetijd</b> mag slechts worden aangerekend als de PT verlengd is.
D27	<b>Titreeren van antinucleaire (ANA) of anticytoplasmatische antilichamen (ANCA)</b> mag slechts worden aangerekend indien de screening mbv. immunofluorescentie een positief resultaat oplevert
D28	<b>Identificatie van ANA (ENA) of ANCA (MPO, PR3)</b> mag slechts worden aangerekend indien de screening met immunofluorescentie positief is (voor een ANA met een titer van tenminste 1/40, voor een ANCA ongeacht de titer)

# DIAGNOSEREGELS

D34	<p><b>Irreguliere antistoffen</b> opsporen met behulp van een antiglobuline test via indirecte methode op een panel bestaande uit gefenotypeerde rode bloedcellen met een minimum van 18 antigenen mag slechts worden aangerekend in geval van</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hemolytische anemie</li> <li>- positieve compatibiliteitstest</li> <li>- positieve directe Coombsreactie (DAT)</li> <li>- perinatale controle van de foetomaternele incompatibiliteit</li> <li>- patiënt met (geschiedenis van) irreguliere antistoffen</li> </ul>
D37	<p><b>Kweek van Clostridium difficile</b> en <b>opsporen van toxines A en B</b> tegen Clostridium difficile mag enkel aangerekend worden bij personen boven 2 jaar</p>
D46	<p>Mogen enkel aangerekend worden in geval van therapeutische monitoring:</p> <p>Doseren van medicatie:</p> <p>methotrexaat, derivaten van anthracycline of cisplatinum aminoglycoside (min. 2 doseringen), vancomycine (min. 2 doseringen), antibiotica (max. 2 antibiotica) anti-aritmisch geneesmiddel of actieve metaboliet ervan, één of meer cardiotonische heterosiden (bv. lanoxine) theophylline anti-epileptisch geneesmiddel benzodiazepine (met HPLC of GC) caffeine in plasma bij het kind tot 12 maanden Lithium in plasma</p> <p>Doseren van tumormarkers NSE, vrij <math>\alpha</math>- of <math>\beta</math>-HCG, TPA, CA549, CA 15.3, CEA, CA19.9, CA195, CA 125</p>
	<p>Mogen enkel aangerekend worden indien voorgeschreven met het oog op diagnose of behandeling van een intoxicatie:</p> <p>Doseren van oa.:</p> <p>Salicylaten, paracetamol, xenobiotica Ethanol, glycolen of hogere alcoholen met een chromatografische methode Cyanide, quaternair ammonium herbicide, pesticiden of hun metabolieten Zware metalen (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni, Sn,Tl), Au of Ag, doseren van lood in bloed Erythrocytair protoporfyrine</p> <p>De verstrekker moet voor iedere patiënt een dossier openen om alle gegevens betreffende de uitgevoerde analyses (chromatogrammen, absorptiespectra, klinische gegevens, ...) te bewaren)</p>
D50	<p>Doseren van <b>IgG4</b> met immunologische methode mag enkel aangerekend worden om een deficiëntie aan te tonen bij een kind van 2 tot 16 jaar oud</p>
D51	<p>Doseren van <b>immuunsuppressiva</b> mag enkel worden aangerekend bij een patiënt na orgaan- of beenmergtransplantatie of ingevolge de medische behandeling van een patiënt met auto-immuun pathologie</p>

# DIAGNOSEREGELS

D54	<b>LDL-cholesterol</b> met uitsluiting van berekeningsmethoden mag enkel aangerekend worden bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie
D55	<b>Homocysteïne</b> in plasma met een specifieke methode mag enkel aangerekend worden bij een patiënt jonger dan 55 jaar met klinische evidentie voor een vasculaire aandoening
D56	<b>Glycohemoglobine in hemolysaat</b> mag enkel aangerekend worden voor een patiënt met diabetes mellitus, mucoviscidose of chronische pancreatitis
D58	<b>Reverse T3</b> mag enkel aangerekend worden bij een patiënt onder behandeling met amiodarone of voor een op intensieve zorgen verblijvende patiënt
D63	<b>Glutamaat decarboxylase</b> (MW65kDa) auto-antilichamen (GAD65) mogen enkel aangerekend worden hetzij voor een diabetische patiënt van minder dan 40 jaar en waarvoor diabetes mellitus maximum 5 jaar eerder werd gediagnostiseerd, hetzij voor een eerstegraadsverwante van een dergelijke patiënt
D64	<b>Titreren van ANCA</b> mag enkel aangerekend worden indien de ANCA screening een positief resultaat oplevert
D68	Identificatie van een receptor-, een membraan-, een cytoplasma of een nucleair <b>antigeen van hematopoïetische cellen</b> , exclusief de antigenen van het HLA-systeem, mag enkel worden aangerekend voor de diagnose van acute hematologische maligniteiten
D69	Identificatie van een receptor, een membraan, een cytoplasma of een nucleair <b>antigeen van hematopoïetische cellen</b> , exclusief de antigenen van het HLA-systeem mag enkel worden aangerekend voor de diagnose en follow-up van hematologische maligniteiten en voor diagnose van congenitale immuno-deficiënties
D70	Doseren van <b>ethanol, doseren van aluminium, doseren van een zwaar metaal</b> (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), van <b>Au of Ag</b> , doseren van <b>lood</b> in bloed, doseren van <b>sulfhemoglobine</b> , doseren van <b>thiocyanaat</b> , kunnen enkel worden aangerekend indien ze zijn voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie
D71	Doseren van de <b>botfractie van alkalische fosfatasen, osteocalcine, degradatieproduct van collageen type1, totale alkalische fosfatasen en elektroforese van de iso-enzymen van alkalische fosfatasen</b> met diagram en berekening mogen enkel worden aangerekend in geval van klinische tekenen van botpathologie
D74	Opzoeken van <b>Chlamydia antilichamen</b> mag enkel worden aangerekend voor diagnose van een niet-urogenitale infectie, lymphogranuloma venereum of perihepatitis
D76	Opzoeken van <b>Helicobacter pylori antilichamen</b> mag enkel worden aangerekend voor eerste diagnose
D77	<b>Chlamydia trachomatis PCR</b> mag enkel worden aangerekend in de klinische context van een risicogroep, tot en met de leeftijd van 20 jaar, of bij duidelijke

# DIAGNOSEREGELS

	klinische tekens van een Chlamydia-infectie. Deze test mag maximum tweemaal per kalenderjaar aangerekend worden
D78	<b>PCR CMV in bloed</b> mag enkel worden aangerekend bij transplantpatiënten, HIV-infectie of bij behandeling met immuunsuppressiva
D79	Opsporen van <b>IgG of IgM antilichamen tegen Borrelia met een immunoblot</b> in bloed of CSV mogen enkel worden aangerekend indien het opsporen van totale of specifieke IgG of IgM antilichamen tegen Borrelia in bloed of in CSV een positief resultaat opleveren en bij duidelijke klinische tekens van een Lyme borreliose. Deze test mag maximaal éénmaal per kalenderjaar aangerekend worden
D81	<b>HSV IgG en IgM</b> mogen enkel worden aangerekend bij immunodeficiënte patiënten
D82	Opzoeken van <b>Streptococcus agalactiae (GBS)</b> door middel van een aanrijkingstechniek op selectieve bodem van een vaginorectaal monster mag één keer en slechts tijdens het laatste kwartaal van eenzelfde zwangerschap aangerekend worden
D83	<b>D-dimeren</b> mogen slechts worden aangerekend in geval van vermoeden van DVT, longembolus, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling
D86	Het doseren van <b>kappa en lambda vrije lichte ketens</b> in serum mag slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de opvolging van patiënten met primaire amyloïdose, lichte keten myeloom en niet-secreterend myeloom
D87	De dosering van <b>tryptase</b> in serum mag slechts worden aangerekend bij acute anafylactische reactie of bij vermoeden van mastocytose
D89	<b>anti-CCP</b> mag slechts éénmaal per kalenderjaar worden aangerekend en dit uitsluitend in het kader van de diagnose van reumatoïde polyarthritis
D90	Opzoeken van <b>Helicobacter pylori</b> antigenen mag slechts worden aangerekend bij een patiënt van 16 tot 50 jaar op basis van klinische gegevens (chronische gastro-duodenale pathologie)
D91	Opsporen van <b>Helicobacter pylori antigenen na behandeling</b> mag enkel aangerekend worden indien zij uitgevoerd wordt tenminstens 3 weken na het stoppen van een antibiotische behandeling met als doel het uitroeien van Helicobacter pylori
D92	<b>Cholinesterase</b> mag enkel worden aangerekend in het geval van vermoeden van intoxicatie van fosfororganische insecticides.
D93	<b>Thyroglobuline</b> mag enkel worden aangerekend in het geval van opvolging van neoplastische schildklierpathologie bij vermoeden van thyreotoxicose, bij exploratie van congenitale hypothyreoïdie of bij evaluatie van een thyreoïditis

# DIAGNOSEREGELS

D94	'ASLO' mag slechts worden aangerekend bij patiënten jonger dan 18 jaar met klinisch vermoeden van acuut gewrichtsreuma na streptokokkenfaryngitis (ARF) of van poststreptokokken reactieve artritis (PSRA)
D95	<b>PT en fibrinogeen</b> mogen slechts <b>samen</b> worden aangerekend in geval van oppuntstelling van een bloedingsdiathese, diffuse intravasculaire stolling, sepsis, leverinsufficiëntie, fibrinolytische therapie en postpartumbloedingen
D97	<b>PSA</b> uitgevoerd in het kader van opsporing bij mannen vanaf 40 jaar oud met familiale antecedenten van prostaatkanker die vóór de leeftijd van 65 jaar gediagnosticeerd werd, mag 1 maal per jaar worden aangerekend
D98	<b>1,25-dihydroxyvitamine D</b> mag enkel worden aangerekend indien voorgeschreven door een geneesheer-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren, in geval van gestoorde calcemie of fosforemie en maximum éénmaal per jaar
D99	Kweek en identificatie, inclusief agglutinatie met een specifiek antiserum, van <b>Escherichia coli O157</b> kan enkel worden aangerekend in het geval van bloederige diarree of hemolytisch-uremisch syndroom
D104	Opsporen van <b>Legionella antigenen in urine</b> mag enkel worden aangerekend voor gehospitaliseerde patiënten die ouder zijn dan 18 jaar, maximum 1 maal per ziekenhuisverblijf, op voorschrift van een geneesheer-specialist
D105	Doseren van <b>humane choriogonadotrofines (hCG)</b> mogen enkel worden aangerekend in het kader van de follow-up van een testis tumor
D113	Doseren van factor H of factor I mag slechts worden aangerekend voor de diagnose van aHUS
D119	<b>CMV IgG en IgM</b> mogen buiten de zwangerschap aangerekend worden
D120	<b>CMV IgG en IgM</b> mogen binnen de zwangerschap enkel aangerekend worden bij klinisch vermoeden van een acute infectie door het cytomegalovirus
D121	<b>Toxoplasma IgG en IgM</b> kunnen niet aangerekend worden tijdens de zwangerschap behalve bij klinisch vermoeden van een acute infectie door toxoplasma gondii
D122	Dosage van <b>calprotectine in faeces</b> mag alleen worden aangerekend voor de follow-up van een bewezen ziekte van Crohn. De test mag alleen worden aangerekend wanneer een geneesheer-specialist de test voorschrijft in een van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren, en dit maximaal twee keer per jaar
D123	Identificatie van <b>andere mycobacteriën dan Mycobacterium tuberculosis</b> mag enkel worden aangerekend op basis van een gemotiveerde aanvraag indien de cultuur positief is voor zuur- en alcoholresistente bacillen en indien de identificatie voor Mycobacterium tuberculosis-complex negatief is

# DIAGNOSEREGELS

D124	<b>Fructosamine</b> mag enkel worden aangerekend bij een diabetische zwangere vrouw of voor een diabetische patiënt met een hemoglobinopathie of een chronische hemolyse
D125	<b>Cystatine C</b> mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij een kind van 1 tot 3 jaar oud of bij patiënten die een niertransplantatie hebben gehad
D126	<b>Jodium</b> in serum of plasma mag enkel worden aangerekend bij zwaar verbrande patiënten bij totaal verbrand oppervlak meer dan 15% of bij patiënten met een ruim huidverlies (Syndroom van Lyell, necrotiserende fasciitis, ...) die een plaatselijke behandeling met jodium krijgen
D127	Opsporen van <b>Toxoplasmose aviditeit</b> mag alleen worden aangerekend tijdens de eerste vier maanden van de zwangerschap bij een positieve dosering van IgM en IgG antilichamen tegen Toxoplasma gondii en bij gebrek aan vroegere informatie over de positiviteit van de IgG. De verstrekking wordt maximaal éénmaal in het leven van een vrouw vergoed
D146	<b>Pro-insuline</b> mag enkel worden aangerekend indien voorgeschreven door een specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren in geval van hypoglycemie met het oog op de diagnose van een insulinoma en maximaal 5 keer per kalenderjaar
D155	<b>25-hydroxyvitamine D</b> mag slechts 1x/kalenderjaar aangerekend worden tenzij bij chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie of bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose) waar de verstrekkingen 3 maal per kalenderjaar aangerekend mogen worden.
D156	<b>Foliumzuur, vitamine B12 of de combinatie foliumzuur+vitamine B12</b> mag slechts 1x/kalenderjaar aangerekend worden