

DIAGNOSEREGELS



Met “mag worden aangerekend” wordt bedoeld “mag worden aangerekend aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering”. Dit betekent dat de analyse, onder de omstandigheden beschreven door de diagnoseregels, terugbetaald wordt door de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver om de gegevens die verband houden met de hieronder vermelde regels kenbaar te maken op het voorschrift.

Tenzij anders vermeld in de omschrijving of de regels, zijn de diagnoseregels en maximaal aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnamen van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift.

D01	Glucose of andere reducerende suikers en totaal eiwit in urine mogen alleen worden aangerekend als het kwalitatief opzoeken een positief resultaat heeft opgeleverd
D03	Microalbumine in urine mag enkel worden aangerekend voor een diabetespatiënt
D05	PSA mag maximaal tweemaal aangerekend worden per jaar van opvolging van de behandeling Ter illustratie: start de opvolging van behandeling op 1 juli, dan mag PSA tweemaal bepaald worden in de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
D06	HCG mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.
D08	Immunotypering en immunofixatie mogen enkel worden aangerekend indien een abnormale band wordt waargenomen bij de eiwitelektroforese
D12	Doseren van aluminium in bloed mag enkel worden aangerekend i.g.v. chronische nierinsufficiëntie (klaring < 20 mL/minuut), en maximaal om de zes maanden, behalve wanneer de aluminiumconcentratie > 50 µg/L bedraagt
D17	Opzoeken van een specifieke verworven stollingsinhibitor mag enkel worden aangerekend indien de PT lager is dan 70% of indien het resultaat van de aPTT verlengd is
D18	Factor II, V, VII, X en het complex VII+X mogen enkel worden aangerekend indien de PTT lager is dan 70 %
D19	Factor XI en XII mogen enkel worden aangerekend indien de aPTT verlengd is
D20	Antithrombine III (activiteit), proteïne C, proteïne S, plasminogeen, factor II mutatie en APC-resistentie mogen alleen aangerekend worden bij patiënten van minder dan 55 jaar met een trombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van recidiverende trombosen of in geval van diffuse intravasale stolling
D21	Factor VII mag alleen worden aangerekend als het complex VII+X een resultaat geeft dat lager ligt dan 70 %



D22	Reptilasetijd mag slechts worden aangerekend als de PT verlengd is.
D27	Titreren van antinucleaire (ANA) of anticytoplasmatische antilichamen (ANCA) mag slechts worden aangerekend indien de screening mbv. immunofluorescentie een positief resultaat oplevert
D28	Identificatie van ANA (ENA) of ANCA (MPO, PR3) mag slechts worden aangerekend indien de screening met immunofluorescentie positief is (voor een ANA met een titer van tenminste 1/40 of voor een ANCA, ongeacht de titer)
D34	Irreguliere antistoffen opsporen met behulp van een antiglobuline test via indirecte methode op een panel bestaande uit gefenotypeerde rode bloedcellen met een minimum van 18 antigenen mag slechts worden aangerekend in geval van - hemolytische anemie - positieve compatibiliteitstest - positieve directe Coombsreactie (DAT) - perinatale controle van de foetomaternele incompatibiliteit - patiënt met (geschiedenis van) irreguliere antistoffen
D37	Kweek van Clostridioides difficile (voormalige Clostridium difficile) en opsporen van toxines A en B tegen Clostridioides difficile mag enkel aangerekend worden bij personen boven 2 jaar
D46	Mogen enkel aangerekend worden in geval van therapeutische monitoring: Doseren van medicatie: - methotrexaat, derivaten van anthracycline of cisplatium - aminoglycoside (min. 2 doseringen), vancomycine (min. 2 doseringen), antibiotica (max. 2 antibiotica) - anti-aritmisch geneesmiddel of actieve metaboliet ervan, één of meer cardiotonische heterosiden (bv. lanoxine) - theophylline - anti-epileptisch geneesmiddel - benzodiazepine (met HPLC of GC) - cafeïne in plasma bij het kind tot 12 maanden - Lithium in plasma Doseren van tumormarkers: NSE, vrij α - of β -HCG, TPA, CA549, CA 15.3, CEA, CA19.9, CA195, CA 125

D49	Mogen enkel aangerekend worden indien voorgeschreven met het oog op diagnose of behandeling van een intoxicatie: Doseren van oa.: - Salicylaten, paracetamol, xenobiotica - Ethanol, glycolen of hogere alcoholen met een chromatografische methode - Cyanide, quaternair ammonium herbicide, pesticiden of hun metabolieten - Zware metalen (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni, Sn,Tl), Au of Ag, doseren van lood in bloed - Erythrocytair protoporfyrine De verstrekker moet voor iedere patiënt een dossier openen om alle gegevens betreffende de uitgevoerde analyses (chromatogrammen, absorptiespectra, klinische gegevens, ...) te bewaren)
D50	Doseren van IgG4 met immunologische methode mag enkel aangerekend worden om een deficiëntie aan te tonen bij een kind van 2 tot 16 jaar oud
D51	Doseren van immuunsuppressiva mag enkel worden aangerekend bij een patiënt na orgaan- of beenmergtransplantatie of ingevolge de medische behandeling van een patiënt met auto-immun pathologie
D54	LDL-cholesterol met uitsluiting van berekeningsmethoden mag enkel aangerekend worden bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie
D55	Homocysteïne in plasma met een specifieke methode mag enkel aangerekend worden bij een patiënt jonger dan 55 jaar met klinische evidentie voor een vasculaire aandoening
D56	Glycohemoglobine in hemolysaat mag enkel aangerekend worden voor een patiënt met diabetes mellitus, mucoviscidose of chronische pancreatitis
D58	Reverse T3 mag enkel aangerekend worden bij een patiënt onder behandeling met amiodarone of voor een op intensieve zorgen verblijvende patiënt
D63	Glutamaat decarboxylase (MW65kDa) auto-antilichamen (GAD65) mogen enkel aangerekend worden hetzij voor een diabetische patiënt van minder dan 40 jaar en waarvoor diabetes mellitus maximum 5 jaar eerder werd gediagnostiseerd, hetzij voor een eerstegraadsverwante van een dergelijke patiënt
D64	Opsporen van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen mag enkel aangerekend worden indien de ANCA screening een positief resultaat oplevert
D68	Identificatie van een receptor-, een membraan-, een cytoplasma of een nucleair antigeen van hematopoïetische cellen , exclusief de antigenen van het HLA-systeem, mag enkel worden

	aangerekend voor de diagnose van acute hematologische maligniteiten
D69	Identificatie van een receptor, een membraan, een cytoplasma of een nucleair antigeen van hematopoïetische cellen , exclusief de antigenen van het HLA-systeem mag enkel worden aangerekend voor de diagnose en follow-up van hematologische maligniteiten en voor diagnose van congenitale immuno-deficiënties
D70	Doseren van ethanol, doseren van aluminium, doseren van een zwaar metaal (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni, Sn,Tl), van Au of Ag , doseren van lood in bloed, doseren van sulfhemoglobine , doseren van thiocyanaat , kunnen enkel worden aangerekend indien ze zijn voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie
D71	Doseren van de botfractie van alkalische fosfatasen, osteocalcine, degradatieproduct van collageen type1, totale alkalische fosfatasen en elektroforese van de isoenzymen van alkalische fosfatasen met diagram en berekening mogen enkel worden aangerekend in geval van klinische tekenen van botpathologie
D74	Opzoeken van Chlamydia antilichamen mag enkel worden aangerekend voor diagnose van een niet-urogenitale infectie, lymphogranuloma venereum of perihepatitis
D76	Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen mag enkel worden aangerekend voor de eerste diagnose (behalve wanneer het controle na behandeling betreft)
D77	Gecombineerde PCR Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae mag enkel worden aangerekend in de klinische context van een risicogroep of bij duidelijke klinische tekenen van een seksueel overdraagbare infectie. Bij een staalafname op meerdere afnameplaatsen mag deze test maar één keer worden aangerekend. Deze test mag maximum tweemaal per kalenderjaar aangerekend worden.
D78	PCR CMV in bloed mag enkel worden aangerekend bij HIV-infectie of bij behandeling met immuunsuppressiva.
D79	Opsporen van IgG of IgM antilichamen tegen Borrelia met een immunoblot in bloed of CSV mogen enkel worden aangerekend indien het opsporen van totale of specifieke IgG of IgM antilichamen tegen Borrelia in bloed of in CSV een positief resultaat opleveren en bij duidelijke klinische tekenen van een Lyme borreliose. Deze test mag maximaal éénmaal per kalenderjaar aangerekend worden
D81	HSV IgG en IgM mogen enkel worden aangerekend bij immunodeficiënte patiënten.

D82	Opzoeken van Streptococcus agalactiae (GBS) door middel van een aanrijkingstechniek op selectieve bodem van een vaginorectaal monster mag één keer en slechts tijdens het laatste kwartaal van eenzelfde zwangerschap aangerekend worden
D83	D-dimeren mogen slechts worden aangerekend in geval van vermoeden van DVT, longembolus, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling
D85	De evaluatie van de specifieke antistofrespons tegen polysaccharide-antigenen (bv. pneumokokken-antistofrespons) mag slechts worden aangerekend na vaccinatie met polysaccharide-antigenen bij persoon met verhoogde vatbaarheid voor infecties
D86	Het doseren van kappa en lambda vrije lichte ketens in serum mag slechts worden aangerekend voor de diagnostische op puntstelling en opvolging van patiënten met primaire amyloïdose, lichte-keten-myeloom, niet-secreterend myeloom en dialysepatiënten met myeloom. De test mag maximaal 12 keer per kalenderjaar worden aangerekend.
D87	De dosering van tryptase in serum mag slechts worden aangerekend bij acute anafylactische reactie of bij vermoeden van mastocytose
D89	anti-CCP mag slechts éénmaal per kalenderjaar worden aangerekend en dit uitsluitend in het kader van de diagnose van reumatoïde polyarthritis
D90	Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen mag slechts worden aangerekend bij een patiënt van 16 tot 50 jaar op basis van klinische gegevens (chronische gastro-duodenale pathologie)
D91	Opsporen van Helicobacter pylori antigenen na behandeling mag enkel aangerekend worden indien zij uitgevoerd wordt tenminstens 4 weken na het stoppen van een antibiotische behandeling en 2 weken na een behandeling met protonpompinhibitoren met als doel het uitroeien van Helicobacter pylori
D92	Cholinesterase mag enkel worden aangerekend in het geval van vermoeden van intoxicatie van fosfororganische insecticides.
D93	Thyroglobuline mag enkel worden aangerekend in het geval van opvolging van neoplastische schildklierpathologie bij vermoeden van thyreotoxicose, bij exploratie van congenitale hypothyreoïdie of bij evaluatie van een thyreoïditis
D94	'ASLO' mag slechts worden aangerekend bij patiënten jonger dan 18 jaar met klinisch vermoeden van acuut gewrichtsreuma na streptokokkenfaryngitis (ARF) of van poststreptokokken reactieve artritis (PSRA)

D95	PT en fibrinogeen mogen slechts samen worden aangerekend in geval van oppuntstelling van een bloedingsdiathese, diffuse intravasculaire stolling, sepsis, leverinsufficiëntie, fibrinolytische therapie en postpartumbloedingen
D97	PSA uitgevoerd in het kader van opsporing bij mannen vanaf 40 jaar oud met familiale antecedenten van prostaatkanker die vóór de leeftijd van 65 jaar gediagnosticeerd werd, mag 1 maal per jaar worden aangerekend
D98	1,25-dihydroxyvitamine D mag enkel worden aangerekend indien voorgeschreven door een geneesheer-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren, in geval van gestoorde calcemie of fosforemie en maximum éénmaal per jaar
D99	Kweek en identificatie, inclusief agglutinatie met een specifiek antiserum, van Escherichia coli O157 kan enkel worden aangerekend in het geval van bloederige diarree of hemolytisch-uremisch syndroom
D105	Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) mag enkel worden aangerekend in het kader van de follow-up van een testistumor
D106	Anti-bèta2-glycoproteïneantistoffen (IgG of IgM), Lupus anticoagulans, Cardiolipine IgG mogen alleen worden aangerekend aan de ZIV in geval van aanwezigheid van klinische criteria voor antifosfolipidensyndroom (vasculaire trombose en/of miskraam) of systemische lupus erythematoses.
D113	Doseren van factor H of factor I mag slechts worden aangerekend voor de diagnose van een atypische hemolytisch-uremisch syndroom (HUS).
D119	CMV IgG en IgM mogen buiten de zwangerschap aangerekend worden
D120	CMV IgG en IgM mogen binnen de zwangerschap enkel aangerekend worden bij klinisch vermoeden van een acute infectie door het cytomegalovirus
D121	Toxoplasma IgG en IgM kunnen aangerekend worden tijdens de zwangerschap behalve bij klinisch vermoeden van een acute infectie door toxoplasma gondii. NB. Buiten D121 om, mogen Toxoplasma IgG en IgM tweemaal per zwangerschap aangerekend worden.
D122	Dosage van calprotectine in faeces mag alleen worden aangerekend voor de follow-up van een bewezen ziekte van Crohn. De test mag alleen worden aangerekend wanneer een geneesheer-specialist de test voorschrijft in een van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren, en dit maximaal twee keer per jaar

D123	Identificatie van andere mycobacteriën dan Mycobacterium tuberculosis mag enkel worden aangerekend op basis van een gemotiveerde aanvraag indien de cultuur positief is voor zuur- en alcoholresistente bacillen en indien de identificatie voor Mycobacterium tuberculosis-complex negatief is
D124	Fructosamine mag enkel worden aangerekend bij een diabetische zwangere vrouw of voor een diabetische patiënt met een hemoglobinopathie of een chronische hemolyse
D125	Cystatine C mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij een kind van 1 tot 3 jaar oud of bij patiënten die een niertransplantatie hebben gehad
D126	Jodium in serum of plasma mag enkel worden aangerekend bij zwaar verbrande patiënten bij totaal verbrand oppervlak meer dan 15% of bij patiënten met een ruim huidverlies (Syndroom van Lyell, necrotiserende fasciitis, ...) die een plaatselijke behandeling met jodium krijgen
D127	Opsporen van Toxoplasma IgG aviditeit mag alleen worden aangerekend tijdens de eerste vier maanden van de zwangerschap bij een positieve dosering van IgM en IgG antilichamen tegen Toxoplasma gondii en bij gebrek aan vroegere informatie over de positiviteit van de IgG. De verstrekking wordt maximaal éénmaal in het leven van een vrouw vergoed
D145	Doseren van Pregnenolone en 17-hydroxypregnenolone mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren met het oog op de diagnose of de opvolging van het adrenogenitaal syndroom en maximum 5 keer per kalenderjaar
D146	Pro-insuline mag enkel worden aangerekend indien voorgeschreven door een specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren in geval van hypoglycemie met het oog op de diagnose van een insulinoma en maximaal 5 keer per kalenderjaar
D155	25-hydroxyvitamine D mag slechts 1x/kalenderjaar aangerekend worden, tenzij diagnoseregels D169 van toepassing is.
D156	Foliumzuur, vitamine B12 of de combinatie foliumzuur+vitamine B12 mag slechts 1x/kalenderjaar aangerekend worden
D159	Chlamydia trachomatis kan pas worden aangerekend na een positief resultaat voor Chlamydia trachomatis via verstrekking 550196 (aangetoond met PCR techniek), minstens 14 dagen na een behandeling tegen Chlamydia trachomatis.
D160	Neisseria gonorrhoeae kan pas worden aangerekend na een positief resultaat voor Neisseria gonorrhoeae via verstrekking

	550196 (aangetoond met PCR techniek), minstens 14 dagen na een behandeling tegen <i>Neisseria gonorrhoeae</i> .
D161	Mazelen IgM kan slechts aangerekend worden bij personen met koorts en een maculo-papulaire rash, die ook minstens één van de volgende symptomen vertonen: hoest, coryza of conjunctivitis
D162	Ureum mag enkel worden aangerekend wanneer de geschatte glomerulaire filtratie snelheid (eGFR) gelijk is aan of lager is dan 30ml/min/1,73m ²
D166	Trombinetijd mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van dysfibrinogenemie of voor het uitsluiten van de aanwezigheid van therapeutische anticoagulantia
D169	25-hydroxyvitamine D mag 3 maal per kalenderjaar aangerekend worden bij chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie of bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose), bij hyper- of parathyroïdie, bij fosfaatdiabetes of behandeling met intraveneus toegediende bisfosfonaten.
D171	Ewitelektroforese mag slecht één keer per kalenderjaar worden aangerekend