PRECAUCIONES:
· Evitar su ingestión, inhalación, contacto con la piel.
· No aplicar en superficies en contacto con alimentos ni utensilios de cocina, platos, plantas ni acuarios.
· No fumar, beber, ni comer durante la aplicación.
· No transportar ni almacenar con medicamentos ni alimentos.
· Mantener fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos.
· Destruya los envases vacíos.
· Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para niños y animales.
· En caso de intoxicación, concurra al médico llevando esta etiqueta.
· Mujeres embarazadas no pueden manipular, ni exponerse al raticida.
· Materia fecal del roedor puede contener raticida, por lo tanto debe realizarse limpieza permanente del lugar desratizado.

PRECAUCIONES GENERALES DE USO: Este producto es tóxico para todos los mamíferos incluso para el hombre. Los roedores deberán ser enterrados. Eliminar los restos del producto en forma segura. Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón. Los profesionales que manipulen este producto deben utilizar ropa de protección y guantes impermeables.

RIESGOS AMBIENTALES: Este es un producto tóxico para los peces, aves y mamíferos –perros, gatos, otros - (inclusive si se alimentan de animales que han consumido el cebo).
No contaminar fuentes de agua.

ALMACENAMIENTO: Mantener y guardar este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco.

ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Entréguelo para reciclar en algún centro de acopio habilitado.

PRIMEROS AUXILIOS: Los anticoagulantes monodósicos de acción prolongada pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación de tiempos de protombina, con una duración de hasta 20 a 30 días después de la exposición al raticida. En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico toxicólogo llevando esta etiqueta. Las medidas de rescate del tóxico y posterior tratamiento serán indicadas exclusivamente por el médico profesional interviniente. No administrar nada por vía oral, especialmente si el paciente se encuentra inconsciente. En caso de contacto con los ojos: mantenga el ojo abierto y enjuague con agua durante 15 minutos, si entra en contacto con la piel o la ropa retire la ropa contaminada y enjuague la piel con agua durante 15 minutos.

SÍNTOMAS: En la mayoría de las ingestiones de cebos anticoagulantes, las víctimas se presentan asintomáticas con pequeñas dosis ingeridas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: Clase IV
Nombre común: difetialone

ADVERTENCIA AL MÉDICO: Clasificación química: cumarina. Contiene el anticoagulante monodósico difetialone. Administrar vitamina K1. El monitoreo de tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 hs. y reiterarse a las 72 hs. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

RECOMENDACIONES DE USO: Rodilon® Pellet es un rodenticida anticoagulante monodósico, listo para usar. Con una sola ingestión, controla ratas y ratones a partir del segundo día. La muerte se asemeja a la que se produce por debilidad o vejez y de este modo sus congéneres no recelan del alimento.

USOS: Restaurantes, casas, edificios, hoteles, hospitales, escuelas, barcos, aviones, micros, salones en general, fábricas, galpones, parques, instalaciones deportivas, alcantarillados, orillas de acequias, canales, corrales, establos y studes (caballerizas).

SENASA Argentina autoriza el uso exclusivamente para los exteriores de los departamentos, para la elaboración de productos comestibles, interiores y exteriores de ceberías, departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomestibles, huesos y harinas incomestibles, depósitos de comestibles cuando se encuentren vacíos.

PLAGAS QUE CONTROLA: Laucha o Ratón doméstico *(Mus musculus)*, Rata del tejado *(Rattus rattus)*, Rata gris *(Rattus norvegicus)*, Rata alejandrina *(Rattus variedad alejandrinus)*, Ratones de campo *(Akodon spp.; Oryzomis spp.; Holochylus spp.)*

FORMA DE USO: Colocar los pellets (cebo) dentro cajas cebaderas de difícil acceso para niños y mascotas o animales no blanco, las cuales deben ser involcables y proteger el cebo de condiciones ambientales.

DOSIFICACIÓN: Ratas: colocar de 25 a 50 g cada 4 a 10 m lineales (dependiendo de la infestación presente). **Ratones:** colocar de 10 a 25 g cada 2 - 4 metros lineales (dependiendo de la infestación presente).

SEGURIDAD: Informar a los usuarios de las instalaciones donde se está realizando las aplicaciones del raticida, la formulación y las precauciones a adoptar, entregándolas por escrito. No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuentes de ventilación que condicionen la persistencia del raticida en el ambiente.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:
DL 50 oral ratas > 5000 mg/kg
DL 50 dermal ratas > 2000 mg/kg
Irritación de la piel en conejos: leve irritante
No sensibilizante dermal.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:
Capital Federal: Ctro. Toxicológico del Hospital de Niños, Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.
Bs. As.: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 0800-333-0160; Hospital de Niños La Plata Tel: (0221) 451-5555 / 0800-222-9911. **Rosario:** Centro Toxicológico TAS, Tel.: (0341) 424-2727, 448-0077, At las 24 hs. **Córdoba:** Hospital de Urgencias, Tel: (0351) 427-6200 int 4135.
Paraguay: Emergencias médicas 595 21 204-800 Técnica Responsable: Verónica Acosta Ubaldi.
Uruguay: C.I.A.T. (Hospital de Clínicas 7° piso) Tel: (02) 1722.

GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad.
El fabricante no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños o perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Argentina Bayer SA
Ricardo Gutierrez 3652 (B1605EHD) Munro, Buenos Aires.
Tel: 08002222 (CUCA) 011-4762 7000
www.proteccionambiental.com.ar
email: saludambiental@bayercropscience.com

Uruguay: Bayer SA
Paysandú 1283
Tel.: 902.00.13

Paraguay: Bayer SA.
Av. Santa Teresa 2245 casi Avda. Aviadores del Chaco
Asunción, Paraguay
595 21 6173500
Representa y Distribuye en Paraguay: Bayer S.A.
DT: Ing Química Victoria Costa de Maluf Reg. Prof: **2307**

Bayer CropScience

Rev. 01/2016

Bayer

Rodilon® PELLET

RODENTICIDA

COMPOSICIÓN Difetialone.....0,0025 g
Harinas de cereales, parafina, azúcar, colorante, benzoato de denatonium, saborizantes, antioxidante, c.s.p.....100 g

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES.
MANTENER EN LUGARES INACCESIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS.
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR JUNTO A ALIMENTOS.
SOLO UTILIZAR EN CAJAS CEBADERAS EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO PARA NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
ATENCION - CUIDADO.

Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

Lote N°:
Fecha de elaboración:
Vto.:

Argentina: RNPUD N°: 0520083
Importador Bayer S.A. RNE: 02000321 2
SENASA: C-2542
Uruguay: Reg. M.S.P. N° 57064 ; Reg. IMM S de S.P. N° 130
Paraguay: Reg. D.N.V.S. : 005 11-01-D2
Origen: Estados Unidos
Argentina Bayer SA: Tel.: (011) 4762-7000

No Inflamable

Contenido Neto: 1 kg

CUIDADO VENENO



Ratas y Ratones

PREVIENE AMAMBANTE INGESTIÓN HUMANA