



Sopheap Tang, DMD & Associates
General Dentistry For Kids

Postoperatorio Instrucciones

Por favor, siga las instrucciones que se indican a continuación:

Su hijo ha tenido un anestésico local para el tratamiento dental necesario. Los niños no siempre entienden los efectos de un anestésico local, y puede masticar o chupar el labio entumecido, la lengua o la mejilla. Aunque esto no es una cosa seria, es una sensación incómoda de su hijo. Por favor, observe a su hijo siguiendo de cerca la cita para la duración de la anestesia, por lo general una o dos horas.

Odontología se ha hecho en la mandíbula inferior. La lengua, el labio, así como los dientes y los tejidos circundantes se entumecida y duerme durante aproximadamente 2 horas.

Odontología se ha hecho en el maxilar superior. Los labios, los dientes y los tejidos circundantes se entumecida y duerme durante aproximadamente 2 horas.

Mantenga a su hijo en una dieta de líquidos hasta que la anestesia haya pasado.

Coronas de acero inoxidable

Si una corona de acero inoxidable, se colocó hoy NO permita que su niño coma alimentos duros, caramelos pegajosos, masticables de ahora en adelante. Como Laffy Taffy, rancheros Jolly, frutas Roll-Ups, ahora y después, etc Si la corona debe salir, por favor llame a la oficina para programar recementación.

Instrucciones para el cuidado en casa-coronas

1. No hay restricciones en sus actividades diarias.
2. Fomentar el cepillado de inmediato. Una boca limpia se cura más rápido.
3. La dieta debe evitar los dulces entre comidas para ayudar a prevenir las caries.
4. Duro, los alimentos pegajosos deben ser evitados.

Nota:

1. Los dientes de su niño y las encías alrededor de la corona puede estar sensible durante varios días tras el nombramiento.
2. Su hijo ha tenido un anestésico local, ver él de cerca por varias horas para evitar que él / ella de masticar su mejilla, la lengua o el labio, que son muy insensibles.

Notifiquenos si alguna de las siguientes situaciones ocurre:

1. La goma alrededor de la corona se vuelve muy inflamados o sensibles.
2. El diente, que tiene la corona, se convierte en dolor o se suelta.

Después de Instrucciones de sedación

La sedación que se le dio a su hijo se llevará a 4-6 horas en desaparecer. Su hijo probablemente se irá a casa y dormir de 1 a 4 horas y no debe ser dejado sin atención, incluso mientras duerme. Vigile a sus hijos cada quince minutos o menos durante el sueño de su niño debe evitar las bicicletas, triciclos, y las escaleras y las actividades que requiere de habilidades motoras.

En ocasiones, la sedación le puede causar a un niño a llegar a ser muy hiperactivo o irritable. Esto dura 30 a 60 minutos y desaparecerán. Es normal que el cuerpo del niño a sentirse caliente y enrojecida aparecen hasta que los efectos de la medicación en desaparecer. Él/ella también puede rascarse la nariz o la cara durante este tiempo, debido a las sensaciones que produce picazón.

Su hijo debe ser capaz de comer 1 a 2 horas después de salir de la oficina, según el tratamiento realizado y la anestesia que se utiliza. Si tiene hambre, comience con caldo o sopa, jugo de manzana, galletas, gelatina, o applesause. Evite todos los productos lácteos.

19040 Van Buren Blvd. ste 111, Riverside, CA 92508
Tel: 951-789-0200 Fax: 951-789-0245
31577 Canyon Estates Dr. ste 205, Lake Elsinore CA, 92532
Tel: 951-674-6900 Fax: 951-674-5934



Sopheap Tang, DMD & Associates
General Dentistry For Kids

Instrucciones postoperatorias-extracción

NO MOLESTAR LA HERIDA: De esta manera usted puede invitar a la irritación, infección y/o sangrado. Asegúrese de masticar en el lado opuesto durante 24 horas y mantener afilados de entrar en la herida (es decir, utensilios para comer, etc.) Usted debe ver la formación de un coágulo de sangre.

CEPILLADO: No cepillarse los dientes durante las primeras 8 horas después de la cirugía. Después, puede cepillarse los dientes con suavidad, pero evite el área de la cirugía (zona de extracción).

Lavar la boca: Evite todo aclarado durante 24 horas después de la extracción. Esto es para asegurar la formación de un coágulo de sangre de curación que es esencial para la cicatrización adecuada. La perturbación de este coágulo puede provocar aumento de la hemorragia o la pérdida de la sangre se coagule. Si el coágulo se pierde, una condición dolorosa llamada alveolitis puede ocurrir. Usted puede usar agua tibia con sal o leve enjuagues antisépticos después de 24 horas sólo si está prescrito.

No escupa o chupar con una pajita: Esto promoverá el sangrado y puede desalojar el coágulo de sangre que causan una alveolitis.

SANGRADO: Al salir de la oficina, se le dará instrucciones verbales sobre el control del sangrado postoperatorio. Un trozo de gasa enrollado se colocará en el sitio de extracción y se le pide que cambie su apósito cada 20 minutos más o menos dependiendo de la cantidad de sangrado que se produce. Es normal que un poco de sangre de exudado de la zona de la cirugía. También le dará un paquete de gasa para llevar con usted para usar en casa si el sangrado debe continuar. Si necesita usar la gasa en su casa, recuerde que debe rodar en una bola lo suficientemente grande como para cubrir la herida. Sostenga firmemente en su lugar, al morder o con presión de los dedos, durante unos 20-30 minutos. Si el sangrado continúa, es posible doblar una bolsita de té por la mitad y muerda sobre ella. El té contiene ácido tánico, un astringente, que puede ayudar a reducir el sangrado.

DOLOR: Un poco de malestar es normal después de la cirugía. Tabletas analgésicas (es decir, Advil, Tylenol, etc) puede ser tomada bajo la dirección de su dentista. La prescripción de medicamentos, que pueden haber sido dado, también se deben tomar según las indicaciones. Si el dolor continúa, llame a su dentista.

HINCHAZÓN: Para evitar la hinchazón, aplique una compresa de hielo o una toalla fría en el exterior de su cara en el ámbito de la extracción durante las primeras 12 horas. Aplique alternativamente, a 20 minutos de de 20 minutos de, por una hora o más si es necesario.

Dieta: Comer comidas regulares normales tan pronto como le sea posible después de la cirugía. Evite masticar los alimentos hasta que se sienta volver a evitar lesiones en la lengua o cheques. Frío, los alimentos blandos, como helado o yogur (si no fueron sedados) puede ser la más cómoda para el primer día. También es importante beber mucho líquido.

Medicamento para el Dolor

Es normal que la boca de su niño a ser dolor después del tratamiento. Children's Advil, Motrin o Tylenol debe tener cuidado de este (si no es alérgico al medicamento).

Informar de cualquier incidencia inusual inmediatamente!

Sopheap Tang, DMD
(951) 789-0200

19040 Van Buren Blvd. ste 111, Riverside, CA 92508
Tel: 951-789-0200 Fax: 951-789-0245
31577 Canyon Estates Dr. ste 205, Lake Elsinore CA, 92532
Tel: 951-674-6900 Fax: 951-674-5934



Sopheap Tang, DMD & Associates
General Dentistry For Kids

19040 Van Buren Blvd. ste 111, Riverside, CA 92508
Tel: 951-789-0200 Fax: 951-789-0245
31577 Canyon Estates Dr. ste 205, Lake Elsinore CA, 92532
Tel: 951-674-6900 Fax: 951-674-5934