



FUNDACIÓN  
CRECIENDO CON ALERGIAS

# > PLAN DE ACCIÓN ANAFILAXIA

Nombre

---



---

Contacto emergencia

---



---

Teléfono

---



---

Contacto emergencia

---



---

Teléfono

---



---

Diagnóstico

---



---

Auto-inyector Epinefrina / Dosis

---



---

Médico

---



---

## + SIGNOS DE ALERTA

**NO RESPIRA BIEN**


**INFLAMACIÓN** lengua, párpados, labios, cara.

**DESMAYO** mareos

**NÁUSEAS** dolor abdominal intenso

**RONCHAS** y picazón generalizada

## APLIQUE AUTO-INYECTOR



**1** retire el seguro azul



**2** aplique fuertemente  
contra el muslo

**3** Posición del paciente

- Después de administrar el auto-inyector, recueste al paciente sobre su espalda, con las piernas ligeramente elevadas.
- Si el paciente tiene dificultad para respirar, puede preferir estar sentado
- Si el paciente presenta náuseas o vómitos, recuéstelo de lado.

TRASLADÉ AL PACIENTE AL SERVICIO DE URGENCIA **SIEMPRE**

### Artículo 494 n°14 del Código Penal

Constituye falta penal no prestar auxilio a una persona que se encuentra en una emergencia médica de riesgo vital evidente.

### Plan de acción Anafilaxia

Revisado por la Sociedad Chilena de Alergias e inmunología y por el comité médico de Creciendo con Alergias Marzo 2019



Sociedad Chilena  
de Alergia  
e Inmunología